

ИЗУЧЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ

УДК 582 669 (282.243 613)

РЕДКИЕ СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ ВО ФЛОРАХ ПРИРОДНЫХ  
КОМПЛЕКСОВ ЮГО-ВОСТОЧНОГО КРЫМА: СОСТОЯНИЕ, СТЕПЕНЬ  
ИЗУЧЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ\*

Миронова Л.П.

ФГБУН «Карадагская научная станция им. Т.И.Вяземского – природный заповедник РАН»,  
пгт. Курортное, г. Феодосия, Российская Федерация,  
e-mail: [ludamir2015@mail.ru](mailto:ludamir2015@mail.ru)

В статье представлены результаты многолетних (1979–2018 гг.) исследований редких видов (РВ) флоры природных комплексов (ПК) Юго-Восточного Крыма (ЮВК). Приведен аннотированный список 154 сосудистых растений, внесенных в Красные книги Российской Федерации, Республики Крым и список 105 таксонов, не имеющих в настоящее время государственного статуса охраны, но редких для данного региона. Проведен анализ флоры редких растений ЮВК. Даны оценка состояния, распространения, экологической приуроченности и численности охраняемых РВ, а также оценка флоры ПК ЮВК с использованием индексов концентрации видового разнообразия, редкости видов и эндемизма. Определена степень изученности РВ в конкретных ПК. Рассматриваются некоторые пути решения проблемы сохранения редких представителей флоры ЮВК и фиторазнообразия в целом.

**Ключевые слова:** Юго-Восточный Крым; природные комплексы; Красная книга Российской Федерации; Красная книга Республики Крым; флора; растительные сообщества; сосудистые растения; редкие виды, популяция; биотоп; степень изученности.

**Введение**

Биологическая ценность природных комплексов, значимость их для сохранения фиторазнообразия во многом определяются числом, численностью и состоянием популяций произрастающих в пределах их территорий редких, эндемичных и реликтовых видов растений (Миронова, 2010, а). В современном мире при усиливающемся антропогенном воздействии на окружающую среду возрастает число растений, переходящих в статус редких, что представляет реальную угрозу сохранению фиторазнообразия на планете и вызывает необходимость постоянного обновления списков видов, требующих охраны.

Создание Красной книги Республики Крым (ККРК) (2015) стало важнейшим итогом изучения флоры Крыма многими поколениями ботаников. ККРК включает 297 таксонов сосудистых растений, в их числе почти все виды Красной книги Российской Федерации (ККРФ) (2008), произрастающие в Крыму, а также большинство таксонов, отмеченных в различных международных охранных списках. При написании очерков о редких видах (РВ) ККРК был выявлен недостаток информации о числе мест произрастания, численности и возрастной структуре популяций ряда растений. Дефицит сведений о состоянии РВ особенно ощущимы по настоящее время для юго-восточной части Крыма.

Флористические исследования ЮВК проводились с конца XIX века. Учёными осуществлялись гербарные сборы, публиковались данные о находках новых, в том числе и

\* Работа выполнена в рамках государственного задания по теме «Изучение биоразнообразия и ландшафтной структуры Юго-Восточного Крыма, мониторинг биотических и абиотических компонентов региональных экосистем» (Госрегистрация № ААА-Ф16-116225100087-5).

редких таксонов, а также о новых местах произрастания уже известных для региона растений. И всё же Юго-Восточный Крым оставался менее изученным, чем Юго-Западный Крым. После организации Карадагского природного заповедника в 1979 г. исследования флоры и растительности стали проводиться систематически и не только на территории Карадага, но и охватили значительные площади далеко за его пределами.

К началу наших исследований (1979 г.) более всего информации имелось о флоре и растительности горных массивов Карадаг (Сарандинаки, 1930, 1931; Котов, 1956, 1959; Дідух, Шеляг-Сосонко, 1982), Агармыш (Цырина, 1930; Дідух, 1981), Эчкидаг (Клюкин, и др., 1990). Фрагментарные сведения встречались в публикациях о растительном покрове хр. Тепе-Оба и Енишарских гор (Сарандинаки, 1916, 1917). Практически отсутствовали данные о растительности хр. Узунсырт, Баракольской котловины, полуострова Меганом и горного массива в окрестностях пгт Краснокаменка. Абсолютно не изучена была флора и растительность Армутлукской долины и хр. Френк-Мезер.

В процессе флористических исследований нами были обнаружены новые для региона виды растений, получены дополнительные сведения о распространении большинства ранее известных таксонов; установлена численность, определено состояние популяций ряда редких видов. По материалам этих исследований составлены и опубликованы конспекты флор восьми природных комплексов ЮВК, сделан краткий обзор флоры и растительности еще 2-х ПК в районе Армутлукской долины и хр. Френк-Мезер. Создан список редких видов, произрастающих на территории 8-ми ЮВК, который неоднократно дополнялся и корректировался в связи с появлением новых находок, охранных списков и изменениями в понимании объема таксонов.

Цель настоящей работы – проведение аналитического обзора данных по видовому составу, особенностям распространения, состоянию, численности, экологической приуроченности и изученности редких таксонов сосудистых растений ЮВК на основе накопленных к настоящему времени материалов по флоре восьми природных комплексов региона; сравнительная оценка флоры природных комплексов ЮВК по наличию в их составе редких и эндемичных растений; освещение проблемы сохранения редких представителей флоры ЮВК и предложение некоторых путей её решения, включая расширения площадей существующих ООПТ и создание новых заповедных территорий; характеристика флористической ценности 2-х перспективных для заповедования ПК.

## Материалы и методы

Флористические исследования региона проводились в период 1979–2018 гг. традиционным маршрутным методом с учетом методических рекомендаций по изучению редких и исчезающих растений флоры Крыма (Голубев, Косых, 1980) на территории, охватывающей площадь более 300 км<sup>2</sup>, включая побережье от хр. Тепе-Оба на востоке до п-ова Меганом на западе и севернее вглубь полуострова до хребтов Френк-Мезер, Агармыш, Узунсырт, горного массива в районе пгт Краснокаменка (рис. 1).

Исследуемый район ЮВК имеют преимущественно гористый рельеф, только на северо-востоке холмистая местность переходит в равнину. Горы региона представлены системой отдельных вершин и пиков, различных по высоте и длине хребтов, гребней, разделенных седловинами, долинами, балками разной глубины и крутизны склонов, встречаются также участки относительно пологие или небольшой крутизны. Значительная часть территории преобразована распашкой под сельскохозяйственные угодья, размещением населенных пунктов, поэтому не нарушенные антропогенным воздействием участки ландшафта имеют нередко островной характер.

Объекты наших исследований – редкие и исчезающие растения флоры природных комплексов Юго-Восточного Крыма. Район исследований – ЮВК, в пределах которого нами выделено 10 ПК, сохранившихся среди антропогенно-модифицированных

ландшафтов в относительно естественном, мало нарушенном состоянии и отличающихся оригинальными формами рельефа, специфическим набором физико-географических характеристик (Муратов, 1960; Павлова, 1964; Ена и др., 2004), разнообразием природно-климатических условий, особо высокой фитоценотической и флористической насыщенностью, повышенной или максимальной концентрацией редких видов (рис. 1).



**Рис. 1.** Карта-схема размещения изученных природных комплексов на территории ЮВК. Примечание: здесь и далее ПК 1 – Карадагский горный массив, ПК 2 – Енишарские горы ( хр. Биюк-Енишары и Кичук-Енишары) с Тихой бухтой, ПК 3 – хр. Тепе-Оба с мысом Ильи, ПК 4 – хр. Узунсырт с Баракольской котловиной и озером Бараколь, ПК 5 – горный массив Агармыш, ПК 6 – район пгт Краснокаменка (включающий гору Сандык-Кая, хр. Сочарчикон-Кая и Гондарлы-Кая), ПК 7 – п-ов Меганом с бухтой Капсель, ПК 8 – горный массив Эчкидаг с Лисьей бухтой, ПК 9 – район Армутлукской долины (включая безымянные холмы и г. Белую), ПК 10 – район хр. Френк-Мезер.

**ПК 1.** Карадагский горный массив, ныне территория Карадагского природного заповедника, на юге и востоке омывается водами Черного моря, северо-восточная граница проходит вдоль Коктебельской балки, юго-западная – вдоль р. Отузки и ее притока – Левой Отузки. Карадаг по генезису и геологическому строению состоит из двух частей, разделенных седловиной Северного перевала и Карадагской балкой. Северо-западная часть территории сложена типичными для горного Крыма юрскими известняками, юго-восточная представляет собой вулканический массив также юрского возраста (Добрынин, 1938; Зенкович, 1938; Левинсон-Лессинг, Дьяконова-Савельева, 1933; Лебединский, Макарова, 1962; Клюкин, 1989; Клюкин, Михаленок, 1989).

**ПК 2.** Природный комплекс, включающий невысокие хребты Биюк-Енишар и Кучук-Енишар (Енишарские горы), Тихую бухту и мыс Киик-Атлама, с севера ограничен небольшой долиной пересыхающей речки Султановки, с юга и востока – Черным морем, с запада – Коктебельской долиной и хребтом Узунсырт. Его территория представляет фрагмент ступенчато-склонового эрозионного овражно-балочного Феодосийского низкогорья с широким развитием оползней. Енишарские горы связаны с Карадагом (ПК 1), поскольку в геологическом строении хребтов, принимают участие, как осадочные породы, так и магматические, метаморфические (Муратов, 1937, Павлова, 1964).

**ПК 3.** Хребет Тепе-Оба – плосковершинная грязь, протянувшаяся на 8–10 км с востока на запад, имеющая довольно пологие северные склоны, местами прорезанные глубокими балками и оврагами, и более крутые южные, обращенные к Двуякорной долине. Хребет представляет самую восточную оконечность Главной гряды Крымских

гор, замыкающую Феодосийское мелкогорье. Нижняя и средняя часть северных склонов хребта, примыкают к городу Феодосия и ещё с VI в. до н. э. были освоены человеком. Восточная часть хребта обрывается в море мысами Феодосия и Святого Ильи, образуя участок побережья Черного моря длиной около 7–8 км. Хребет сложен преимущественно меловыми отложениями, которые перекрыты рыхлыми породами палеогена (Муратов, 1937, 1960; Павлова, 1964).

**ПК 4.** Природный комплекс, включающий хр. Узунсырт, г. Коклюк и Баракольскую котловину, является фрагментом Феодосийского мелкогорья. Плосковершинный хр. Узунсырт (г. Клементьева или Планерная) образует слабовыпуклую дугу длиной около 5,5 км. Южный склон хребта довольно крутой и имеет абразионно-оползневой тип рельефа, северный и северо-восточный склоны более пологие и менее расчленены. Гора Коклюк по геологическому строению отличается от хребта, её верхняя часть представлена меловыми и палеогеновыми мергелями и известняками, которые выходят на дневную поверхность на южном склоне в виде причудливых скал. Баракольская котловина – уникальное геологическое и геоморфологическое образование, в центре которого находится пересыхающее соленое озеро Бараколь (Муратов, 1937, 1960; Павлова, 1964).

**ПК 5.** Хребет Агармыш – останцевый яйлинский массив, расположенный обособленно в восточной части Главной гряды Крымских гор, между Горным и Равнинным Крымом, вблизи и севернее пгт Старый Крым. Хребет представляет собой горную цепь с несколькими вершинами протяженностью с юго-запада на северо-восток около 8 км. Как и вся Главная гряда Крымских гор, Агармыш состоит из пластов верхнеюрских известняков. Слоны хребта довольно крутые, а вершина – плоская, что роднит его с другими яйлинскими массивами Горного Крыма. Благодаря карстовым явлениям, характерным для яйл, хр. Агармыш изрезан трещинами, щелями, провалами, встречаются пещеры (Лебединский, 1982; Каменских, 2007).

**ПК 6.** Горный массив в районе пгт Краснокаменка расположен восточнее хребта Папас-Тепе и севернее Черноморского побережья уходя вглубь полуострова на 7–10 км. Район ограничен бассейнами рек: с юга и запада течет р. Кучук-Узень (Монастырский ручей) по глубокой Кизилташской долине, с востока и севера граница проходит по долине реки Биюк-Узень (Кабакташский ручей), протекающей по дну Водяной балки. ПК включает гору Сандык-Кая, хр. Сочарчикон-Кая, Гондарлы-Кая, Курбан-Кая и другие более мелкие горы, и хребты. Это внутренний фрагмент Главной гряды Крымских гор. Вершины гор и хребтов скалистые, реже – платообразные, их склоны преимущественно крутые, местами переходят почти в вертикальные обрывы. Все горы сложены рифовыми известняками верхнеюрского возраста. Г. Сандык-Кая – самый крупный в Юго-Восточном Крыму ископаемый риф, мощность его известняков около 500 м (Муратов, 1937; Павлова, 1964).

**ПК 7.** Меганом – полуостров с ландшафтом пустынного облика, расположен на отрезке побережья между мысом Француженка (на юго-западе) и устьем р. Коз (на северо-востоке). На участках берега Меганомской возвышенности, где обнажаются верхнеюрские конгломераты, с трудом поддающиеся абразии, образуются четыре скалистых мыса: Рыбачий (Кильсе-Бурун), Меганом (Чобан-Басты), который выступает из общего направления береговой линии далеко на юг и является оконечностью Восточного Крыма, а также мысы Бугас и Толстый (Мердюан-Катмер). На мысе Рыбачьем к морю спускаются оползни, образуя густую разветвленную сеть бедленда – «дурных земель». Под действием процессов эрозии на полуострове сформировался эрозионно-аккумулятивный низкогорный рельеф, рассеченный сетью оврагов, балок, ущелий (Добринин, 1938; Зенкович, 1938; Корженевский, Клюкин, 1989).

**ПК 8.** Горный массив Эчкидаг, располагаясь между Козской и Отузской долинами, со всех сторон окружен шлейфом предгорий, только на юго-востоке

территория омывается Черным морем, образуя Лисью бухту. Эчкидаг состоит из двух скальных гряд, вытянутых с юго-запада на северо-восток, общей протяженностью около 3 км. В основании хребта преобладают слои глин, в средней части – песчаники, а в верхней – известняки. С остатками известняков коралловых рифов, лежащих в основе привершинной части хребта, связаны карстовые явления. На южном склоне массива большая сухость стимулирует процессы физического выветривания, поэтому значительная часть балок (Деляметская), оврагов (Крутой, Сухой и Ветвистый) приморского склона расчленена эрозионными понижениями, загромождена скоплениями камней, что является последствием бурных паводков и селей (Добрынин, 1938; Зенкович, 1938; Клюкин и др., 1990; Боков, Костенко, 1999).

**ПК 9.** Природный комплекс включает относительно небольшие по площади безымянные холмы и гору Белую в районе Армутлукской долины. Безымянные холмы расположены западнее г. Татар-Хабурга, вблизи пгт Коктебель, в 3 км от северо-западной границы Карадагского природного заповедника. Второй фрагмент ПК, включающий г. Белую, находится в западной части Армутлукской долины на расстоянии около 3-х км от безымянных холмов, севернее пос. Щебетовки на 4 км и юго-восточнее Старого Крыма на 7,5 км (Миронова, Фатерыга, 2015).

**ПК 10.** Френк-Мезер – крупный известняковый массив южного отрога хр. Туар-Алан, расположенный ниже его и к западу от г. Сандык-Кая. Массив является фрагментом внутреннего района Главной гряды Крымских гор и представляет собой протяженный, дугообразно изогнутый и понижающийся с севера на юго-запад хребет, он расчленен ущельями, балками, долинами.

Территории исследуемых ПК располагаются в пределах низкогорного ландшафтного уровня южного макросклона Крымских гор (Ена и др., 2004). Для всех ПК характерны преобладание склоновых форм рельефа, разнообразие экспозиций и крутизны склонов, перепады абсолютных высот в несколько сот метров на сравнительно небольших расстояниях. Максимальные высоты ПК ЮВК колеблются от 105 (ПК 9) до 722 (ПК 5) м н. у. м. (табл. 1).

**Таблица 1.**  
**Некоторые физико-географические параметры природных комплексов ЮВК**

№ ПК	Название территории	Площадь, км <sup>2</sup>	Высшая точка	Макс. высота, м н. у. м.
1	Карадагский горный массив	21	г. Святая	576
2	Енишарские горы	16	г. Джан-Куторан	238
3	Хр. Тепе-Оба с мысом Св. Ильи	29	хр. Тепе-Оба	289
4	Хр. Узунсырт и Баракольская котловина	18	г. Коклюк	180
5	Горный массив Агармыш	38	г. Б.Агармыш	722
6	Горный массив в районе пгт Краснокаменка	28	г. Сандык-Кая	700 (698,9)
7	Полуостров Меганом	27	г. Меганом	358
8	Горный массив Эчки-Даг с Лисьей бухтой	23	г. Кара-Оба	670
9	Безымянные холмы и гора Белая в Армутлукской долине	2	Безымянный холм / г. Белая	105 / 177
10	Горный массив Френк-Мезер	25	г. Френк-Мезер	665

Климат юго-восточной части Крыма, характеризуется как северный вариант средиземноморского, переходного к умеренному. Средняя годовая сумма осадков колеблется в весьма значительных пределах от 272 мм в год на п-ве Меганом (ПК 7) до 545 мм в районе пгт Краснокаменка (ПК 6) и 514 мм на горном массиве Агармыш (ПК 5) (Боков, 2003; Климатический атлас Крыма..., 2000). На склонах северных

экспозиций гор, выше 400 м над уровнем моря количество осадков увеличивается, достигая в привершинной части гор 600–800 мм (Боков, Костенко, 1999).

Многообразие природных условий от резко ксерофитных до мезофитных способствовали формированию почв от богатых темно-бурых лесных под тенистыми высокоствольными лесами (ПК 5, ПК 6, ПК 9) и черноземовидных под луговой степью (ПК 1–6, ПК 8, ПК 10) до маломощных вариантов коричневых бескарбонатных почв (местами солончаковых и солонцеватых) под ксерофитными опустыненными и полупустынными степями – на побережье в районе Тихой, Лисьей и Капсельской бухт (ПК 2, ПК 7, ПК 8). На значительной территории ПК под степной и нагорно-ксерофитной растительностью почвы коричневые с карбонатными, бескарбонатными и солонцеватыми разновидностями, они характеризуются повышенной щебнистостью и каменистостью (Кочкин, 1967; Драган, 1989, 2004). Особое внимание в период исследований уделялось поиску новых мест произрастания редких, исчезающих и эндемичных растений, целенаправленное изучение которых было начато ещё в 1976 г. на территории Карадагского горного массива (Шатко, 1979; Миронова, Шатко, 2004), а в последующие годы расширилось на всю вышеуказанную площадь. На участках обнаружения редких таксонов, глазомерно фиксировали все характерные признаки экотопа и состояние ценопопуляций, проводили геоботаническое описание стандартным методом.

Списки редких охраняемых и неохраняемых видов растений ПК ЮВК составлены по данным инвентаризации флор сосудистых растений, с учётом таксонов, обнаруженных нами и другими исследователями в последующие годы после публикации конспектов флор, анализа специальной литературы, с учётом публикаций других авторов, а также данных сайта «Плантариум» (<http://www.plantarium.ru/>) (табл. 2).

**Таблица 2.**  
**Публикации, включающие данные по флоре изученных ПК ЮВК**

№ ПК	Название территории	Источники
1	Карадагский горный массив	Сарандинаки, 1916, 1917, 1930, 1931; Шатко, 1979; Дидух, Шеляг-Сосонко, 1982; Шатко, Миронова, 1986а; Шатко, Волковская, Миронова, 1994; Миронова, Каменских, 1995; Каменских, Миронова, 2004; Миронова, 1999б, 2010б; Миронова, Шатко, 2008; Миронова, Таран, 2011; Миронова, Фатерыга, 2015; Рыфф, 2015а; Фатерыга, 2019
2	Енишарские горы	Белянина, Шатко, 1998, 2000; Рыфф, 2017
3	Хр. Тепе-Оба с мысом Св. Ильи	Сарандинаки, 1916, 1917, 1930, 1931; Шатко, Миронова, 2011
4	Хр. Узунсырт и Баракольская котловина	Миронова, Шатко, 2009а, б
5	Горный массив Агармыш	Цырина, 1930; Дідух, 1981; Каменских, 2007, 2011
6	Горный массив района пгт Краснокаменка	Миронова, Шатко, 2007; Шатко, Миронова, 2008
7	Полуостров Меганом	Шведчикова, 1982; Корженевский, Клюкин, 1989; Крайнюк, Рыфф, 2001, 2004, 2005; Миронова, Шатко, 2010, 2013
8	Горный массив Эчки-Даг с Лисьей бухтой	Клюкин, Корженевский, Щепинский, 1990; Миронова, 1999а, б; Миронова, Шатко, 2001; Рыфф, 2012
9	Безымянные холмы и гора Белая в Армутлукской долине	Миронова, Фатерыга, 2014
10	Горный массив Френк-Мезер	Отсутствуют

В аннотированном списке охраняемых редких видов ККРФ и ККРК (табл. 3) приведены данные по основной биоморфе, биотопической приуроченности, созологическому статусу, распространению видов, их численность в баллах в пределах восьми природных комплексов. Использовались сокращения и условные обозначения, указанные ниже в примечании к табл. 3. Природные комплексы во всех таблицах и по тексту статьи обозначались как на карте-схеме (рис. 1).

Данные о жизненной форме видов заимствованы из «Биологической флоры Крыма» (Голубев, 1996). При обосновании редкости видов, не имеющих государственного статуса охраны, использовалась шкала редкости так же из «Биологической флоры Крыма» (Голубев, 1996).

Для определения экологической приуроченности вида в пределах ПК были выделены 22 основных биотопа на высшем уровне их иерархии по общепринятым принципам (Быков, 1973; Миркин, Розенберг, 1983). Характеристика биотопов приведена ниже в разделе «Характер распространения РВ по основным биотопам в пределах ПК ЮВК».

В аннотированном списке охраняемых растений ЮВК (табл. 3, гл.1) для каждого таксона указаны биотопы, в которых они были нами зафиксированы при ботаническом обследовании территории. Учитывались также находки мест произрастания растений, сделанные другими авторами, литературные данные и устные сообщения, подтвержденные гербарными образцами или фотоснимками. В статье приняты следующие условные обозначения биотопов: лт – тенистые высокоствольные леса; лтп – опушки и поляны, тенистых высокоствольных лесов; лс – светлые среднерослые леса; лсп – опушки и поляны светлых среднерослых лесов; кш – заросли листопадных кустарников и шибляковые низкорослые дубово-грабинниковые сообщества; кшп – опушки и поляны шибляковых низкорослых дубово-грабинниковых сообществ; рд – редколесья можжевеловые, фисташковые, дубовые; рдп – опушки и поляны редколесья; сл – луговая степь; сн – настоящая степь; сп – петрофитная степь; рзн – разнотравно-злаковые сообщества; огс – опустыненные степи; сс – саванноидно-степные сообщества; фр – фриганоидные сообщества; со – не сомкнутые петрофитные группировки и единичные хазмофиты; ркс – разреженная полукустарниковая внутриконтинентальная растительность на подвижном каменистом субстрате; ргс – разреженная внутриконтинентальная растительность на подвижном глинистом субстрате (включая бедленды); пкс – сильно разреженная растительность приморских глинисто-каменистых склонов; пгсэ – сильно разреженная степная, галофитная и псаммофитная растительность на каменисто-глинистых склонах (включая бедленды) в зоне воздействия морского аэрозоля; мп – галофитная, псаммофитная, гало-нитрофитная растительность песчаных и галечниковых пляжей морского побережья; увд – растительность берегов водоемов, временных водотоков, мест с дополнительным увлажнением, внутриконтинентальных озер (включая оз. Бараколь).

При характеристике статуса редких видов использованы материалы Красной книги Российской Федерации (2008), Красной книги Республики Крым (2015), Конвенции по международной торговле видами дикой флоры и фауны, Бернской конвенции (Мосякін, 1999; Mosykin, Fedorovichuk, 1999), исправленные дополнения ... к Бернской конвенции (Revised Annex I...to the Bern Convention, 2011), Европейского красного списка 1998 г., Европейского красного списка 2011 г. (Bilz et al., 2011); Красной книги Черного моря (Black Sea Red Data Book ..., 1999).

Численность вида на территории ПК определялась различными методами. При установлении численности популяций, занимающих площадь более 500 м<sup>2</sup> в случайном порядке, закладывали 30 учетных площадок (размером 1x1 м), в популяциях площадью от 100 до 500 м<sup>2</sup> – 10 таких площадок, в пределах которых подсчитывали число особей по возрастным состояниям.

Таблица 3.

**Сосудистые растения 8-ми природных комплексов Юго-восточного Крыма, имеющие федеральный (ККРФ) и республиканский (ККРК) статус охраны**

Таксономические группы / основная биоморфа / биотоп	Эндемы / Статус охраны	Номер природного комплекса															
		1	2	3	4	5	6	7	8								
		Численность в баллах															
1	2	3															
<b>Отдел POLYPODIOPHYTA – ПАПОРОТНИКОВЫЕ</b>																	
Сем. <i>Pteridaceae</i> E.D.M. Kirchn. – орляковые [Сем. <i>Sinopteridaceae</i> Koidz. – Синоптерисовые]. Порядок <i>Polypodiales</i> – многоножковые.																	
<i>Notholaena marantae</i> (L.) Desv. [Paragymnopteris marantae (L.) K. H. Shing] – Пол. – со, ркс	ККРК -3	1	-	-	-	-	-	-	-								
<b>Отдел PINOPHYTA (GYMNOSPERMAE) – ГОЛОСЕМЕННЫЕ</b>																	
Сем. <i>Cupressaceae</i> S. F. Gray – Кипарисовые. Порядок <i>Cupressales</i> – кипарисовые.																	
<i>Juniperus deltoides</i> R. P. Adams [ <i>J. oxycedrus</i> auct. non L.] – Д-К. – лс, кшп, рд, со, ркс	ККРК -2	6	-	-	-	+	6	6	6								
<i>Juniperus excelsa</i> M. Bieb. – Д. – лс, кшп, рд, ркс (Дідух, 1981)	ККРК -2/ККРФ-2а	6	-	-	-	(+)	6	1-2	2								
Сем. <i>Pinaceae</i> Spreng. ex F. Rudolphi – Сосновые. Порядок <i>Pinales</i> – сосновые.																	
<i>Pinus brutia</i> Ten. [ <i>P. stankewiczii</i> (Sukacz.) Fornin; <i>P. pityusa</i> Steven]** – Д. – со	ККРК -2/ККРФ-2а	5	-	-	-	-	Ед. *	-	1								
<b>Отдел MAGNOLIOPHYTA (ANGIOSPERMAE) – ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ</b>																	
Сем. <i>Amaranthaceae</i> Juss. (частично включая <i>Chenopodiaceae</i> ) – щирицевые. Порядок <i>Caryophyllales</i> – гвоздикоцветные.																	
<i>Krascheninnikovia ceratoides</i> (L.) Gueldenst. [ <i>Ceratoides papposa</i> Botsch. et Ikonnn.] – Пк. – пгсэ	ККРК -3	-	+	+	+	-	-	+	-								
Сем. <i>Amaryllidaceae</i> J. St.-Hil. (включая <i>Alliaceae</i> Batsch ex Borkh.) – Амариллисовые. Порядок <i>Asparagales</i> – спаржецветные.																	
<i>Allium nathaliae</i> Seregin [ <i>A. erubescens</i> auct. non K. Koch] – Пол. – со, ркс	ЭК/ККРК -3	1	-	-	-	-	2-3*	-	+\$								
<i>Allium siculum</i> (Ucria) Lindl. subsp. <i>dioscoridis</i> (Sm.) K. Richt. [ <i>Nectaroscordum meliophilum</i> Juz.] – Пол-МОН. – лт, лтп	ККРК -3/ ЕКС <sub>2011</sub>	4	-	-	-	-	-	-	-								
<i>Galanthus plicatus</i> M. Bieb. – Пол. – лт, лтп, лс, лсп, кшп, кшп	ККРК -2/ККРФ-2а/ ЕКС <sub>2011</sub> /СИТЕС	6	2	+	2	6	6	-	5								
<i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. et. Kit. – Пол. – ргс	ККРК -2/ККРФ-1/ СИТЕС	-	-	1-2	-	-	-	-	-								
Сем. <i>Anacardiaceae</i> R. Br. – Сумаховые. Порядок <i>Sapindales</i> – сапindoцветные.																	
<i>Pistacia mutica</i> Fisch. et. C. A. Mey. – Д. – лс, кшп, рд	ККРК -3/ККРФ-3г	6	2*	+\$	-	-	+	6	+								
Сем. <i>Apiaceae</i> Lindl. ( <i>Umbelliferae</i> Juss.) – сельдерейные (Зонтичные). Порядок <i>Apiales</i> – сельдереецветные.																	
<i>Astrodaucus littoralis</i> (M. Bieb.) Drude. – Мон, одн. – пкс, пгсэ	ККРК -3/ККЧМ	1*	1*	+\$	-	-	-	+\$	+\$								
<i>Critchmum maritimum</i> L. – Пол. – мп, пгсэ	ККРК-3/ККРФ-3г	+	-	-	-	-	-	1*	-								
<i>Eryngium maritimum</i> L. – Пол. - мп	ККРК-2/ККРФ-2а, 6/ ККЧМ	Ед.	1	1	-	-	-	2*	1								
<i>Ferula caspica</i> M. Bieb. [ <i>Ferula euxina</i> Pimenov] – Пол. – пкс, пгсэ, огс	ККРК -3	-	2	1-2	+	-	-	1-2	-								
<i>Heracleum ligusticifolium</i> M. Bieb. – Пол. – фр, со	ЭК/ККРК-3/ЕКС	-	-	-	-	-	1*	-	Ед.*								

Продолжение таблицы 3.

<i>Prangos trifida</i> (Mill.) Herrnst. Et Heyn [ <i>Cachrys alpina</i> M. Bieb.] – Пол. – пгс, пкс	KKPK -3/ККРФ-0	-	2	-	-	-	-	-	-	-
<i>Rumia crithmifolia</i> (Willd.) Koso-Pol. – Пол. – лсп, кшп, рдп, сп, рзн, фр	ЭК / ККPK - 3/ ЕКС <sub>1998</sub> / СИТЕС	+	3	+	2	+	+	3	+	
Сем. <i>Aposynaceae</i> Juss. (включая <i>Asclepiadaceae</i> R. Br.) – кутровые. Порядок <i>Gentianales</i> – горечавкоцветные.										
<i>Trachomitum venetum</i> (L.) Woodson s.l. [incl. <i>T. venetum</i> subsp. <i>sarmatiense</i> (Woodson) Avetisjan; <i>T. venetum</i> subsp. <i>tauricum</i> (Pobed.) Greuter et Burdet] – Пол. – пгсэ, мп, узд	ЭК/ККPK -3	-	1	1	-	-	-	+	-	
Сем. <i>Araceae</i> Juss. (включая <i>Lemnaceae</i> ) – Ароидные. Порядок <i>Alismatales</i> – частухоцветные.										
<i>Arum italicum</i> Mill. Subsp. <i>albispathum</i> (Steven ex Ledeb.) Prime [ <i>A. albispatum</i> Steven ex Ledeb.] – Пол. – лт, лтоп	KKPK -3	0	-	-	-	Ед. *	Ед. *	-	-	
Сем. <i>Asparagaceae</i> Juss. (частично включая <i>Liliaceae</i> Juss.) – Спаржевые. Порядок <i>Asparagales</i> – спаржецветные.										
<i>Anthericum liliago</i> L. – Пол. – лсп, рдп, ркс, пгс (Рыфф, 2012)	KKPK -3	-	-	-	-	-	-	-	-	(2-3)
<i>Asparagus maritimus</i> (L.) Mill. [ <i>A. levinae</i> Klokov] – Пол. – пгсэ, мп	KKPK -2/ЕКС	-	-	+*	-	-	-	1*	-	
<i>Bellevalia speciosa</i> Woronow ex Grossh. [ <i>B. sarmatica</i> (Pall. ex Miscz.) Woronow] – Пол. – сп, рзн	KKPK -2/ККРФ-2а	3	+	+	2	-	+	+	+	
<i>Scilla bifolia</i> L. – Пол. – лт, лтп, лс, лсп, кшп	KKPK -4	6	+	+	+	6	6	6	6	
<i>Scilla siberica</i> Haw. – Пол. – лт, лтп, лс, лсп	KKPK -2	-	-	-	-	2*	-	-	-	
Сем. <i>Asteraceae</i> Martinov ( <i>Compositae</i> ) – астровые. Порядок <i>Asterales</i> – астроцветные.										
<i>Anthemis sterilis</i> Steven s. l. [incl. <i>A. transscheliana</i> Fed.] – Пол. – сп, фр, со (Дидух, 1981; Каліста и др., 2015)	ЭК / ККPK - 3/ЕКС <sub>1998</sub>	6	2	-	-	(+) *	6	-	-	+
<i>Centaurea ovina</i> aggr. [incl. <i>C. caprina</i> Steven; <i>C. lavrenkoana</i> Klokov; <i>C. steveniana</i> Klokov] – Двул. – ркс, пгс, пкс	KKPK -4	+	+	+	2	-	+	+	+	
<i>Ptilostemon echinocephalus</i> (Willd.) Greuter [ <i>Lamyra echinocephala</i> (Willd.) Tamamsch.] – Пол. – фр, со, ркс	KKPK -2	+	1	+	1	-	1	+	+	
<i>Rhaponticoides taliewii</i> (Kleopow) M.V.Agap. et Greuter [ <i>Centaurea taliewii</i> Kleopow] – Пол. – сп, ргс	KKPK -2	-	+	-	1	-	-	-	-	+
Сем. <i>Boraginaceae</i> Juss. – Бурачниковые. Порядок <i>Boraginales</i> – бурачникоцветные.										
<i>Argusia sibirica</i> (L.) Dandy [ <i>Tournefortia sibirica</i> L.] – Пол. – пгсэ, мп	KKPK -2	+	1	1	-	-	-	+	+	
<i>Buglossoides tenuiflora</i> (L.f.) M. Johnst. – Одн. – рдп, рзн, ркс, со (Фото Свирина С.А.; Серегин, 2018)	KKPK -3	(+)	-	-	-	-	-	-	-	+
<i>Onosma polyphylla</i> Ledeb. – Пол. – сп, ркс, фр, со	KKPK -3/ККРФ-3д/ ЕКС <sub>1998</sub> / БК	4	+*	+*	3*	-	5	+	4	
<i>Rindera tetraspis</i> Pall. – Пол. – сп, ргс	KKPK -2	-	3	-	1	-	-	-	-	

Продолжение таблицы 3.

Сем. Brassicaceae Burnett (Cruciferae Juss.) – Крестоцветные (капустные). Порядок Brassicales – капустоцветные.											
<i>Brassica cretacea</i> (Kotov) Stancov ex Tzvelev – Пол. – ркс, ргс	KKPK -3/КК РФ - 3б	-	-	1	+	-	-	-	-	-	-
<i>Cakile maritima</i> Scop. subsp. <i>euxina</i> (Pobed.) E. I. Nyarady [ <i>Cakile euxina</i> Pobed.] – Одн. – мп	KKPK -2	1	1	1	-	-	-	1	+		
<i>Conringia clavata</i> Boiss. – Одн. – рдп, ркс, ргс (Ільїнська, 2009; Рыфф, 1915 а)	KKPK -3	+	+	(+)	+	-	+*	+	-		
<i>Crambe koktebelica</i> (Junge) N. Busch s. l. [incl. <i>C. mitridatis</i> Juz.] – Пол. – пгсэ, мп (Калистая и др. 2013)	KKPK -3/ККРФ-2а/ ЕКС <sub>2011</sub> , БК/ККЧМ/	1	1	1	-	-	-	2*	1		
<i>Crambe maritima</i> L. [ <i>Crambe pontica</i> Steven ex Rupr.] – Пол. – пгсэ, мп (Калистая и др. 2013)	KKPK -3/ЕКС <sub>2011</sub> , ККЧМ	Ед. -1	+	+	-	-	-	1-2	1		
<i>Crambe pinnatifida</i> W. T. Aiton – Пол. – пгсэ, мп	KKPK -2	0	-	-	-	-	-	+*	-		
<i>Crambe steveniana</i> Rupr. – Пол. – рзн, ркс, ргс	KKPK -2/ККРФ-3д/ /ЕКС <sub>2011</sub> .	0	+	+*	+*	-	-	+*	+*		
<i>Crambe tataria</i> Sebeok – Пол. – рзн, ргс (Prina, 2009)	KKPK -2/ ЕКС <sub>2011</sub> ДБК/	+	1-2	+	1	-	-	+*	-		
<i>Hesperis steveniana</i> DC. – Пол. – лсп, кшп, рдп	KKPK -3	4	-	-	-	+*	+*	-	+*		
<i>Isatis littoralis</i> Steven ex DC. [ <i>Isatis tomentella</i> Boiss. et Balansa] – Пол. – со, ркс, пгсэ	KKPK -3/ ЕКС	1	2	+	+	-	+*	1*	1*		
<i>Lepidium turczaninowii</i> Lipsky – Пол. – ргс	KKPK -2	-	-	3-4	-	-	-	-	-		
<i>Teesdalia coronopifolia</i> (J. P. Bergeret) Thell. – Одн. – со, ркс (Фатерыга, 2019)	KKPK -3	(0)									
Сем. Capparaceae Juss. – Каперсовые											
<i>Capparis herbacea</i> Willd. [ <i>C. spinosa</i> auct. non L.] – Пол. – рзн, ркс, ргс, пгсэ	KKPK -3	6	3	5	4	-	4	6	6		
Сем. Caprifoliaceae Juss. (включая Dipsacaceae Juss. и Valerianaceae Batsch) – Жимолостные. Порядок Dipscales – ворсянкоцветные.											
<i>Scabiosa praemontana</i> Privaiova – Мон. – фр, со, ркс (Кечайкин и др. 2018)	ЭК/ККPK -3	+	+	+	-	-	-	+	+		
Сем. Caryophyllaceae Juss. – Гвоздичные. Порядок Caryophyllales – гвоздикоцветные.											
<i>Cerastium biebersteinii</i> DC. – Пкч. – фр, со, ркс	ЭК /ККPK -3/ ЕКС <sub>1998</sub> .	2-3	-	-	-	-	3	-	2		
<i>Cerastium bulgaricum</i> Uechtr. [ <i>C. pseudobulgaricum</i> Klokov; <i>Cerastium schmalhausenii</i> Pacz.] – Одн. – рдп, фр, ркс	KKPK -3/ЕКС <sub>1998</sub>	1	-	1	-	-	-	-	+		
<i>Minuartia adenotricha</i> Schischk. – Пкч. - со	ЭК/ ККPK -3	1	+	-	-	-	+	+	+*		
<i>Minuartia euxina</i> Klokov [ <i>M. setacea</i> auct. non (Thuill.) Hayek] – Пкч. - со	ЭК /ККPK -3	+	-	-	-	-	+	+*	+*		
<i>Minuartia taurica</i> (Steven) Graebn. [ <i>Alpine taurica</i> L.] – Пкч. - со	ЭК/ККPK -3/ МСОП	+*	-	-	-	-	+*	*+			
<i>Paronychia cephalotes</i> (M. Bieb.) Besser – Пкч. – сп, фр, со, ркс	KKPK -6/ККРФ-2а	4	3	2	3	+	5	4	4		
<i>Silene supina</i> M. Bieb. s. l. [incl. <i>S. syreitschikowii</i> P. Smirn.] – Пкч. – сп, ркс, со, пгсэ	KKPK -3	3	2*	-	-	-	-	+	+		

Продолжение таблицы 3.

Сем. Cleomaceae Bercht. Et J. Presl – Клеомовые. Порядок Brassicales – капустоцветные.										
<i>Cleome ornithopodioides</i> L. subsp. <i>canescens</i> (DC.) Tzvelev [ <i>C. canescens</i> DC., <i>C. iberica</i> auct. p. p.] – Одн. – ргс, пкс, пгсэ	ЭК / KKPК -3	1-2	+	1	-	-	-	-	-	-
Сем. Colchicaceae DC. – Безвременниковые. Порядок Liliales – лилиецистные.										
<i>Colchicum ancyrense</i> B. L. Burtt – Пол. – сн, сп, рзн	KKPК -2	4-5	4	3	3	-	5	+	6	
<i>Colchicum umbrosum</i> Steven – Пол. – лт, лтп, лс, лсп, кш	KKPК-3/ККРФ-2а	+	-	-	-	+	+	-	+	
Сем. Convolvulaceae Juss. (включая Cuscutaceae Bercht. et J. Presl.) – выонковые. Порядок Solanales – пасленоцветные.										
<i>Convolvulus sericocephalus</i> Juz. – Пол. – сп, ркс, ргс	KKPК -3	-	+	+	+	-	-	+	-	
Сем. Crassulaceae J. St.-Hil. – Толстянковые. Порядок Saxifragales – камнеломкоцветные.										
<i>Sedum rubens</i> L. – Одн. – со, ркс, ргс	KKPК -3	0*	-	-	-	-	+*	+*	-	
Сем. Euphorbiaceae Juss. – Молочайные. Порядок Malpighiales – мальпигиевые.										
<i>Euphorbia paralias</i> L. – Пол. – мп	KKPК -2/ККЧМ	+*	+*	+*	-	-	-	-	-	
<i>Euphorbia rigida</i> M. Bieb. – Пол. – со, ркс, пкс	KKPК-6/КК РФ -2а	Ед-1	+*	+*	Ед-1*	-	-	1	Ед	
Сем. Fabaceae Lindl. ( <i>Papilionaceae</i> , включая <i>Caesalpiniaceae</i> ) – Бобовые. Порядок Fabales – бобовоцветные.										
<i>Astragalus arnacantha</i> M. Bieb. [ <i>Astracantha arnacantha</i> (M. Bieb.) Podlech] – Кч, К. – сп, фр, рзн, ргс, огс	KKPК -3/ККРФ-2а,б/ ЕКС	5	+	4	4	-	5	6	6	
<i>Astragalus ponticus</i> Pall. – Пол. – лсп, кш, ргс	KKPК -3	0	-	-	2	+*	+*	3	1	
<i>Astragalus redundus</i> Pall. [ <i>A. similis</i> Boriss.] – Пол. – лсп, кшп, рдп, сл, ргс, огс	KKPК -3 /ЕКС <sub>1998</sub> /БК	+	1	1	+	-	-	1	-	
<i>Astragalus suprapilosus</i> Gontsch. – Пкч. – рзн, фр, ркс, ргс	ЭК/KKPК -3/ЕКС <sub>1998</sub>	5	3	+	5	-	3	4	3	
<i>Astragalus testiculatus</i> Pall. – Пкч. – сп, огс	KKPК -3	+	+	+	+	-	-	2	+	
<i>Genista albida</i> Willd. [ <i>Genista godetii</i> Spach] – Кч. – рдп, сп, фр, со, ркс	KKPК -6/ККРФ-3д	3	+	2	3	+	2	4	3	
<i>Hedysarum candidum</i> M. Bieb. – Пол. – лсп, кшп, рлп, сп, фр, ргс	KKPК -2/ККРФ-3а	2-3	3-4	+	3	+	3	6	2	
<i>Hedysarum tauricum</i> Pall. ex Willd. – Пкч. – лсп, кшп, рдп, сп, ргс	KKPК -3	6	6	5	6	+	3	6	6	
<i>Lens ervoides</i> (Brign.) Grande. – Одн. – кшп, рдп, рзн, фр	KKPК -2/ ЕКС <sub>2011</sub>	2*	+*	+*	-	-	-	-	+*	
<i>Onobrychis pallasii</i> (Willd.) M. Bieb. [ <i>Xanthobrychis pallasii</i> (Willd.) Galushko] – Пол. – ркс, ргс	ЭК/KKPК -3	2-3	2	2	3	1	1	1-2	2	
<i>Pisum sativum</i> L. subsp. <i>elatius</i> (M. Bieb.) Asch. et Graebn. [ <i>P. elatius</i> M. Bieb.] – Одн. – рдп, сл, сп, рзн, ркс, ргс	KKPК -3/ЕКС <sub>2011</sub>	1-2	2	-	-	-	2*	+	+	
<i>Vicia ervilia</i> (L.) Willd. – Одн. – рзн, ркс, ргс, пкс	KKPК -3/ЕКС <sub>2011</sub>	+	2*	+*	-	-	-	-	-	
Сем. Gentianaceae Juss. – Горечавковые										
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds. – Одн. - увд	KKPК -0	(0)	-	-	-	-	-	-	-	
Сем. Geraniaceae Juss. – Гераниевые. Порядок Geriales – гераниевыецветные.										
<i>Geranium tuberosum</i> L. – Пол. – лсп, кшп, рлп, сл, рзн	KKPК -3	1	1	1	1*	-	-	+*	+	

Продолжение таблицы 3.

Сем. Iridaceae Juss. – Касатиковые. Порядок Asparagales – спаржецветные.											
<i>Crocus pallasii</i> Goldb. – Пол. – лсп, сп, рзн, фр	KKPK -2	5	3	+	+	-	3	2	4		
<i>Crocus speciosus</i> M. Bieb. – Пол. – лт, лтп, лс, лсп, кшп, рдп	KKPK -3/ККРФ-2аб	3	-	-	-	+	4	-	2		
<i>Gladiolus imbricatum</i> L. s. I. [incl. <i>G. tenuis</i> M. Bieb.] – Пкч. – со, ркс, увд (Фото Анварова В.М.)	KKPK -2	-	-	-	-	-	(1-2)*	-	-		
<i>Iris pumila</i> L. – Пол. – сп, фр, ркс, пкс	KKPK -3/ККРФ-3б	5	6	3	4	+	2	6	5		
Сем. Lamiaceae Martinov ( <i>Labiatae</i> Juss.) – яснотковые. Порядок Lamiales – ясноткоцветные.											
<i>Salvia scabiosifolia</i> Lam. s. l. [incl. <i>S. demetrii</i> Juz.] – Пкч. – сп, фр, ркс	KKPK -3/ EKC <sub>1998</sub>	3	2	1	5	+	4	3	2		
<i>Satureja montana</i> L. subsp. <i>taurica</i> (Veien.) P. W. Ball – Пкч. – сп, фр, со, ркс	ЭК/ККPK -3	-	-	-	-	+	-	**	-		
<i>Sideritis syriaca</i> L. s. l. [incl. <i>S. syriaca</i> subsp. <i>catillaris</i> (Juz.) Gladkova; <i>S. syriaca</i> subsp. <i>taurica</i> (Steph. ex Willd.) Gladkova] – Пкч. – сп, фр, со, ркс	ЭК/ККPK -3	4	+	+	6	+	+	**	5		
<i>Vitex agnus-castus</i> L. Кч. – пгсэ, мп, увд	KKPK -3	-	-	-	-	-	-	+	-		
Сем. Liliaceae Juss. – Лилейные. Порядок Lamiales – ясноткоцветные.											
<i>Gagea bulbifera</i> (Pall.) Salisb. – Пол. – сп, рзн, ргс, огс (Ена, 2015)	KKPK -1	-	(+)	-	-	-	-	-	-		
<i>Tulipa biflora</i> Pall. [ <i>T. koktebelica</i> Junge] – Пол. – фр, ркс, пкс, пгсэ (Фото Анварова В.М.)	KKPK -2	-	-	-	-	-	(4)	6	6		
<i>Tulipa suaveolens</i> Roth [ <i>T. schrenkii</i> Regel; <i>T. gesneriana</i> auct. Non L.] – Пол. – сп, рзн, ргс, пкс	KKPK -2 / ККРФ-2а,б	5	5	2	4	-	5	5	3		
<i>Tulipa sylvestris</i> L. subsp. <i>australis</i> (Link) Pamp. – Пол. – сн, сп, рзн, со, ргс	KKPK -2	-	3-4	-	-	-	2	-	-		
Сем. Linaceae DC. ex Perled – Льновые. Порядок Malpighiales – малыпигиевцевные.											
<i>Linum pallasianum</i> Schult. – Пкч. – сп, фр, ркс	ЭК / KKPK -3	3	+	+	3-4	1	2	2	1		
Сем. Lythraceae J. St.-Hil. – Дербенниковые. Порядок Myrales – миртоцветные.											
<i>Lythrum thymifolia</i> L. [ <i>L. melanospermum</i> Sävul. et Zahar., <i>L. hyssopifolia</i> L. subsp. <i>thymifolia</i> (L.) Batt.] - Одн. - увд	KKPK -3/EKC <sub>2011</sub>	+	*	-	-	+	+	1	-		
Сем. Malvaceae Juss. (включая <i>Tiliaceae</i> Juss.) – Мальвовые. Порядок Malvales – мальвоцветные.											
<i>Tilia dasystyla</i> Steven – Д. – лт, лс, ркс	KKPK-3/EKC <sub>1998</sub>	1	-	-	-	1	3	-	+		
Сем. Nitrariaceae Lindl. (включая <i>Peganaceae</i> (Engl.) Tieghem ex Takht.) – Селитрянковые. Порядок Sapindales – сапиндоцветные.											
<i>Nitraria schoberi</i> L. – К. – пгсэ, мп	KKPK -3	0	1	+	-	-	-	1	2		
Сем. Orchidaceae Juss. – Орхидные. Порядок Asparagales – спаржецветные.											
<i>Anacamptis morio</i> (L.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase subsp. <i>caucasica</i> (K. Koch) H. Kretzschmar, Eccarius et H. Dietr. [ <i>Orchis morio</i> L. auct. p. p.; <i>O. picta</i> auct. non Loisel.] – Пол. – лсп, кшп, рдп, сл, сп, рзн	KKPK-3/ККРФ-3г/ EKC <sub>2011</sub> / СИТЕС/	4-5	3-4	+	3	+	3	3	3		
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich. – Пол. – лтп, лсп, кшп, рдп, сл, рзн	KKPK -3/ККРФ-3г/ EKC <sub>2011</sub> СИТЕС	3	3	4	3	3	+	4*	5		

Продолжение таблицы 3.

<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce – Пол. – лт, лтп, лс, лсп	KKPK -3/ККРФ-3г/ ЕКС 2011 СИТЕС	2	Ед.	1*	-	+	2	+*	Ед.
<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch – Пол. – лт, лтп, лс, лсп, кшп	KKPK -3/ККРФ-3г/ ЕКС 2011 СИТЕС	1	-	-	-	+*	1*	-	Ед.
<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich. – Пол. – лт, лтп, лс, лсп, кш, кшп	KKPK -3/ККРФ-3б/ ЕКС 2011 СИТЕС	Ед. -1	-	-	-	Ед *	1	-	Ед
<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm. [ <i>Dactylorhiza viridis</i> (L.) R. M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase] – Пол. – лтп (Дидух, 1981).	KKPK -3/СИТЕС	-	-	-	-	(+)*	-	-	-
<i>Comperia comperiana</i> (Steven) Asch. et Graebn. [ <i>C. taurica</i> K. Koch; <i>Himantoglossum comperianum</i> (Steven) P. Delforge] – Пол. – кш, кшп	KKPK -2/БК-П1/ СИТЕС- П2	-	-	-	-	-	-	-	Ед*
<i>Dactylorhiza romana</i> (Seb. et Maun) Soo (Sebast.) [ <i>Orchis romana</i> Sebast.] – Пол. – лт, лтп, лс	KKPK -3 ЕКС 2011 СИТЕС	Ед. -1*	-	-	-	Ед -1*	1*	-	-
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz s. l. [incl. <i>E. helleborine</i> subsp. <i>levantina</i> Kreutz, Óvári et Shifman; <i>E. turcica</i> Kreutz; <i>E. latifolia</i> (L.) All.] – Пол. – лт, лс, кш	KKPK -3/ ЕКС 2011 СИТЕС	Ед-1	-	-	-	1	1	-	+
<i>Epipactis krymmontana</i> Kreutz, Fateryga et Efimov [ <i>E. purpurata</i> auct. non Sm.; <i>E. condensata</i> auct. p. p.; <i>E. latifolia</i> (L.) All. var. <i>viridiflora</i> auct. Fl. Taur.] – Пол – лт, лс (Фатерыга А., Фатерыга В., 2016; Фатерыга В., Фатерыга А., 2019)	KKPK -3	(+)	-	-	-	-	-	-	-
<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw. – Пол. – лт, лтп, лс, лсп, кш, кшп	KKPK -3/ ЕКС 2011 СИТЕС	Ед. -1	-	-	-	-	+	-	+
<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz. – Пол. – лтп, увд	KKPK -2/ ЕКС СИТЕС	0	-	-	-	-	+*	-	0
<i>Himantoglossum caprinum</i> (M. Bieb.) Spreng. [ <i>H. affine</i> (Boiss.) Schltr.] – Пол. – лсп, кшп, рдп, сл, рзн	KKPK -3/ ККРФ-1/ ЕКС/ БК/ СИТЕС	5-6	1-3	-	1-2	1	3-4	Ед	5-6
<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw. – Пол. – лт, лтп, лс, лсп, кш, кшп, рд	KKPK -3/ККРФ-3г/ ЕКС 2011 СИТЕС/	1-2	-	-	Ед.	1-2	2	Ед *	1-2
<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich. – Пол. – лт, лс	KKPK -3/ ЕКС 2011 СИТЕС/	1*	-	-	-	1*	1*	-	-
<i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff et Fingerh. [ <i>Listera ovata</i> (L.) R. Br.] – Пол. – лт, лтп, лс	KKPK -3/СИТЕС	-	-	-	-	Ед *	-	-	+
<i>Neotinea tridentata</i> (Scop.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase [ <i>Orchis tridentata</i> Scop.] – Пол. – лтп, лсп, кшп, рдп, сл, рзн	KKPK -3/ККРФ-3г/ ЕКС 2011 СИТЕС	4	3	+	3	+	4	1-2	4-5
<i>Ophrys apifera</i> Huds. – Пол. – лсп, кшп	KKPK-1/ККРФ-1/ СИТЕС	-	-	Ед-1	-	-	+	-	-
<i>Ophrys oestrifera</i> M. Bieb. [ <i>O. cornuta</i> Steven] – Пол - лсп, кшп, рдп, сл, рзн	KKPK -2/ККРФ-2а/ ЕКС 2011 БК/ СИТЕС	1	-	2	-	-	1-2	-	1
<i>Orchis mascula</i> (L.) L. [ <i>O. wanjkowii</i> E. Wulff; <i>O. pinetorum</i> Boiss. et Kotschy; <i>O. signifera</i> auct. non Vest] – Пол. – лсп, кшп	KKPK-3/ККРФ-3б,г / СИТЕС	+	-	+*	-	+	+	-	+

## Продолжение таблицы 3.

<i>Orchis militaris</i> L. subsp. <i>stevenii</i> (Rchb. f.) B. Baumann et al. [ <i>O. militaris</i> auct. p.p.] – Пол. – лтп, лсп	ККРК-2/ККРФ-3б,г/СИТЕС/	0	-	+*	-	-	-	-	-
<i>Orchis punctulata</i> Stev. ex Lindl. – Пол. – лс, лсп, кшп	ККРК -2/ККРФ-3г/ ЕКС 2011 БК/ СИТЕС	Ед. -1	1	1	1-2	1	1	-	Ед
<i>O. purpurea</i> Huds. – Пол. – лтп, лс, лсп, кшп, кшп, рд	ККРК -3/ККРФ-3б,г/ ЕКС 2011 СИТЕС	3-4	1	2-3	1	1	4	1-2	2-3
<i>O. simia</i> Lam. – Пол. – лсп, кшп, рдп, сл, сн, сп, рзн	ККРК -3/ККРФ-3б,г/ СИТЕС/ ЕКС 2011.	4-5	Ед-2	2	2	+	3	4	5
<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich. – Пол. – лтп, лсп, кшп	ККРК-4/ СИТЕС	-	-	1*	-	-	-	-	Ед*
<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Reichenb – Пол. - лтп, лсп, кшп, рзн	ККРК -3/ ЕКС 2011. СИТЕС	1-3	Ед	1-2*	1	+*	1-2	-	1-2
<i>Steveniella satyrioides</i> (Spreng.) Schlt. [ <i>Himantoglossum satyrioides</i> Spreng.] – Пол. – лтп, лсп	ККРК -2/ККРФ-1/ СИТЕС/ БК	-	-	-	-	Ед *	+*	-	-
Сем. <i>Orobanchaceae</i> Vent. – заразиховые. Порядок <i>Lamiales</i> – ясноткоцветные.									
<i>Phelypaea coccinea</i> (M. Bieb.) Poir. – Пол. – сп, рзн	ККРК -2	-	-	-	+	-	-	-	-
Сем. <i>Paeoniaceae</i> Raf. – Пионовые. Порядок <i>Saxifragales</i> – камнеломкоцветные.									
<i>Paeonia daurica</i> Andrews [ <i>P. triternata</i> Pall. ex DC.] – Пол. – лтп, лс, лсп, кшп, кшп, рд	ККРК -3	4	2	3	1	+	6	-	5
<i>Paeonia tenuifolia</i> L. [ <i>P. biebersteiniana</i> Rupr.; <i>P. lithophylla</i> Kotov] – Пол. – лсп, кшп, рдп, сл, сп, рзн	ККРК -2/ККРФ-2б/ ЕКС 2011. БК	5	6	4	6	+	5	6	2
Сем. <i>Papaveraceae</i> Juss. (включая <i>Fumariaceae</i> Marquis и <i>Hyposcoaceae</i> Willk. et Lange) – Маковые. Порядок <i>Ranunculales</i> – лютикоцветные.									
<i>Glaucium flavum</i> Crantz – Пол., Мон. – мп, пгсэ	ККРК -2/ ККРФ-2б/ ККЧМ	1-3	+*	+*	-	-	-	+*	1
Сем. <i>Plantaginaceae</i> Juss. – подорожниковые. Порядок <i>Lamiales</i> – ясноткоцветные.									
<i>Globularia trichosantha</i> Fisch. et C.A. Mey. – Пол. – фр (Каменских, 2011)	ККРК -3/ КК РФ-3г	-	-	-	-	(1)	-	-	-
Сем. <i>Poaceae</i> (R. Br.) Barnh. – мятликовые (Злаковые). Порядок <i>Poales</i> – мятликоцветные.									
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link – Одн. – ркс, пгсэ, мп (Рыфф, 2012, 2015 б)	ККРК -3	-	-	(+)	-	-	-	+	-
<i>Elytrigia stipifolia</i> (Czern. ex Nevski) Nevski – Пол. – сн, рзн (Рыфф, 2012, 2015 б)	ККРК -3/ ККРФ-2а	+	+*	(+)	(+)	-	-	(+)	+
<i>Elytrigia strigosa</i> (M. Bieb.) Nevski [ <i>Elytrigia scythica</i> (Nevski) Nevski] – Пол. – фр, со	ЭК/ККРК -3	+	-	-	+	+*	-	-	-
<i>Leymus racemosus</i> (Lam.) Tzvelev subsp. <i>sabulosus</i> (M. Bieb.) Tzvelev – Пол. – мп	ККРК -3	-	1	+	-	-	-	+	1-2
<i>Stipa capillata</i> L. – Пол. – лсп, кшп, рдп, сл, сн, сп, рзн, фр	ККРК -3	6	5	4	5	6	5	6	6
<i>Stipa eriocaulis</i> Borb. subsp. <i>lithophila</i> (P. Smirn.) Tzvelev [ <i>Stipa lithophila</i> P. Smirn.] – Пол. – фр, со, ркс	ЭК/ККРК -3/ ЕКС 1998	4-5	+	3	+	2	3	5	4
<i>Stipa lessingiana</i> Trin. et Rupr. subsp. <i>brauneri</i> Pacz. [ <i>Stipa brauneri</i> (Pacz.) Klokov] – Пол. – сн, сп	ККРК -3	6	4	3	4	+	2	4	4
<i>Stipa pontica</i> P. Smirn. [ <i>Stipa poëtica</i> Klokov] – Пол. - сн, сп, ркс	ККРК -3	6	4	+	+	+	+	5	+

Продолжение таблицы 3.

<i>Stipa pulcherrima</i> K. Koch [ <i>S. heterophylla</i> Klokov; <i>S. oreades</i> Klokov] – Пол. – рдп, сл, сн, сп, ркс	KKPK -3/ККРФ-3г	6	5	3	6	4	3	5	3
<i>Stipa syreitschikowii</i> P. Smirn. [ <i>S. brachyptera</i> Klokov] – Пол. – сп, со, ркс	KKPK -3/ККРФ-1/ БК/ ЕКС <sub>2011</sub>	4	+*	+*	+*	-	-	+	+
<i>Stipa tirsa</i> Steven – Пол. – сл, сн, сп	KKPK -3	2	+*	+*	+*	-	-	+	+
<i>Stipa ucrainica</i> P. Smirn. [ <i>S. zalesskii</i> auct. Non Wilensky] – Пол. – сн, сп	KKPK -3/ККРФ-3г	4-6	3	+*	+*	+*	+*	+	+
<i>Triticum boeoticum</i> Boiss. – Одн. – рзн, сс	KKPK -3	-	-	+*	-	-	-	-	-
Сем. <i>Polygonaceae</i> Juss. – Гречишные. Порядок <i>Caryophyllales</i> – гвоздикоцветные.									
<i>Atraphaxis replicata</i> Lam. – Пкч. – со, ркс	KKPK -3	+	1	+	-	-	-	2	1
<i>Rumex scutatus</i> L. subsp. <i>hastifolius</i> (M. Bieb.) Borodina – Пол. – ркс, ргс	KKPK -3	0	-	-	+*	-	-	-	-
Семейство <i>Primulaceae</i> Batsch ex Borkh – Первоцветные. Порядок <i>Dipsacales</i> – ворсянкоцветные.									
<i>Cyclamen coum</i> Mill. [ <i>Cyclamen kuznetzovii</i> Kotov et Chernova]* – Пол. – лс	KKPK -3/ ЕКС/СИТЕС/ БК	1	-	-	-	-	-	-	-
Сем. <i>Ranunculaceae</i> Juss. – Лютниковые. Порядок <i>Ranunculales</i> – люткоцветные.									
<i>Adonis vernalis</i> L. – Пол. – лсп, кшп, рдп, сл, рзн	KKPK -3//ЕКС <sub>2011</sub> СИТЕС	5	3	2	6	1	5	4	3
<i>Delphinium fissum</i> Waldst. et Kit. subsp. <i>pallasii</i> (Nevski) Greuter et Burdet [ <i>Delphinium pallasii</i> Nevski] – Пол. – лсп, кшп, рдп, сп, ркс, ргс	KKPK -3	3-5	4*	+*	1- 2*	+	6	-	3
<i>Pulsatilla halleri</i> (All.) Willd. subsp. <i>taurica</i> (Juz.) K.Krause [ <i>P. taurica</i> Juz.; <i>P. lithophila</i> Kotov] – Пол. – сп, фр, со	ЭК/ККПК -3/ ЕКС <sub>1998</sub> ДБК	4-5	-	-	+	+	4	-	2-3
Сем. <i>Rosaceae</i> Juss. – розовые. Порядок <i>Rosales</i> – розоцветные.									
<i>Crataegus karadaghensis</i> Pojark. – К. – кш, рд	KKPK -3/ЕКС	1	+	+	2	1	-	+*	+
<i>Crataegus meyeri</i> Pojark. [ <i>Crataegus stankovii</i> Kossykh] – Д-К. – кш, рд	KKPK -3	1-2	-	+*	-	1	-	+	-
<i>Crataegus orientalis</i> Pall. ex M. Bieb. subsp. <i>pojarkoviae</i> (Kossykh) Byatt [ <i>Crataegus pojarkovae</i> Kossykh] – Д-К. – кш, рд	ЭК/ККПК-3/ ЕКС <sub>1998</sub>	2	Ед	-	Ед	-	-	-	-
<i>Crataegus sphaenophylla</i> Pojark. – Д-К. – кш, кшп, рд, рдп, сп, рзн	ЭК/ККПК -3/ЕКС <sub>1998</sub>	5	3	+	+	2	+	+	+*
<i>Crataegus taurica</i> Pojark. – Д-К. – лс, кш, рд	KKPK -3/ЕКС <sub>1998</sub>	5	2	+	2	+	+	+	+
<i>Crataegus tournefortii</i> Griseb. – Д-К. – кш, рд	KKPK -3	0	-	-	-	1	-	-	-
Сем. <i>Scrophulariaceae</i> Juss. – Норичниковые. Порядок <i>Lamiales</i> – ясноткоцветные									
<i>Verbascum orientale</i> (L.) All. [ <i>Celsia orientalis</i> L.] – Оз. одн. – со, ркс, пкс, пгсэ	KKPK -3	+*	+*	+*	+*	-	+*	+*	-
<i>Verbascum phoeniceum</i> L. – Мон. – сл, сп	KKPK -3	Ед.	+*	-	-	-	-	-	-
<i>Verbascum pinnatifidum</i> Vahl. – Пол. – пгсэ, мп	KKPK -3	0	+*	+*	-	-	-	+	-
Сем. <i>Solanaceae</i> Juss. – пасленовые. Порядок <i>Solanales</i> – пасленоцветные.									
<i>Atropa bella-donna</i> L. – Пол. – лтп, сл, сп	KKPK -3/ККРФ- 26	-	-	-	-	+*	+	-	1
Сем. <i>Xanthorrhoeaceae</i> Dumort. (включая <i>Asphodelaceae</i> ) – Ксанторреевые. Порядок <i>Asparagales</i> – спаржецветные.									
<i>Asphodeline lutea</i> (L.) Reichenb. – Пол. – рдп, сл, сп, фр	KKPK -3	-	-	-	-	6	6	-	-

Продолжение таблицы 3.

<i>Asphodeline taurica</i> (Pall.) Endl. – Пол. – сп, фр, ркс	ККРК -3/ ККРФ-3в	6	5	5	6	6	6	6	6
<i>Eremurus spectabilis</i> M. Bieb. [incl. <i>E. thiodanthus</i> Juz.; <i>E. jungei</i> Juz.] – Пол. – кшп, рдп, фр, ркс, ргс	ККРК -3/ ККРФ-2а / ЕКС	3-4	-	-	-	1-2	5	-	2

Примечание: Гл. 1 – знаком \*\* отмечены два вида, интродуцированные на территорию Карадагского заповедника: *Cyclamen coum* и *Pinus brutia* (Шатко, Миронова 2000 б; Саркина, Миронова, 2015); жирным шифром выделены 29 видов, за которыми ведутся мониторинговые наблюдения; данные по жизненной форме заимствованы из «Биологической флоры Крыма» (Голубев, 1996) и имеют следующие условные обозначения: Д – дерево, К – кустарник, Д-К – дерево или кустарник, Пк – полукустарник, Пк-К – полукустарник или кустарник, Кч. – кустарничек, Пкч – полукустарничек, Пол – поликарпическая трава, Мон – двулетний или многолетний монокарпик, Пол-Мон – поликарпик-монокарпик, Одн – однолетник озимый или яровой, Мон-Одн – монокарпик или однолетник; условные обозначения биотопов, где проявляется вид, указаны в методике; для видов, находки которых сделаны другими авторами, приводятся литературные источники, ссылки на гербарные образцы или фотоснимки.

Гл. 2 – созологический статус видов имеет буквенные обозначения: ЭК – эндем Крыма, ККРК – Красная книга Республики Крым (2016), ККРФ – Красная книга Российской Федерации (2008), СИТЕС – Конвенция по международной торговле видами дикой флоры и фауны; СИТЕС-П2 – Приложение 2 к Конвенции по международной торговле видами дикой флоры и фауны; БК – Бернская конвенция; ДБК – Исправленные дополнения к Бернской конвенции; БК-П1 – приложение 1 к Бенской конвенции; ЕКС<sub>1998</sub> – Европейский красный список 1998 г.; ЕКС<sub>2011</sub> – Европейский красный список 2011 г.; ЕКС – Европейские красные списки 1998 и 2011 гг.; ККЧМ – Красная книга Черного моря.

Гл. 3 – 10 в верхней строке таблицы указан номер ПК: Карадагский горный массив – ПК 1, Енишарские горы с Тихой бухтой – ПК 2, хр. Тепе-Оба с мысом Ильи – ПК 3, хр. Узунсырт с Баракольской котловиной и озером Бараколь – ПК 4, горный массив Агармыш – ПК 5, район Кизилташа, включающий гору Сандык-Кая, хр. Сочарчикон-Кая и Гондарлы-Кая – ПК 6, п-ов Меганом с бухтой Капсель – ПК 7, горный массив Эчкидаг с Лисьей бухтой – ПК 8.

Гл. 3 – 10 – в нижних строках приводятся данные о виде: 0 – присутствие вида не подтверждено в течение 30 лет; (0) – вид включен в список на основании литературных данных, но присутствие не подтверждено: + – присутствие вида зафиксировано, но данные о численности отсутствуют; (+) – вид приводится на основании литературных данных, фотоматериалов или гербарных образцов, указанных в Гл. 1 после названия и информации о нем; известные данные общей ориентировочной численности вида на территории ПК указаны в баллах, где: Ед. – популяция вида имеет численность разновозрастных особей до 10 экземпляров, 1 – от 11 до 100, 2 – от 101 до 500, 3 – от 501 до 1000, 4 – от 1001 до 5000, 5 – от 5001 до 1000 000, 6 – свыше 1000 000.

Гл. 3–10 – знаком \* обозначены виды, присутствие которых впервые нами отмечено или подтверждено на территории ПК ЮВК, но в ККРК этой информации нет.

В малочисленных популяциях, произрастающих компактно и занимающих небольшую площадь (менее 100 м<sup>2</sup>), подсчитывали все разновозрастные особи. Полученную численность вида на учетных площадках интерпретировали на всю площадь, занятую популяцией данного вида, а затем на всю территорию ПК, получая общую ориентировочную численность вида в пределах конкретного ПК.

Общая численность вида в аннотированном списке (табл. 3) приводится в баллах, где: Ед. – популяция численностью до 10 экземпляров, 1 – от 11 до 100, 2 – от 101 до 500, 3 – от 501 до 1000, 4 – от 1001 до 5000, 5 – от 5001 до 1000 000, 6 – свыше 1000 000 разновозрастных особей. Для некоторых редких видов, численность которых существенно меняется по годам, были организованы мониторинговые наблюдения на стационарных площадках (Миронова, Шатко, 2004).

Сравнительная оценка флористического разнообразия ПК дана с использованием индекса редкости видов (ИРВ) в %. (Кожаринов, Морозова, 1997). Индекс редкости видов ККРК (ИРВ) в % рассчитан по формуле: ИРВ = Ni\*100/S/A, где Ni – число видов высших сосудистых растений ПК; S – число видов, имеющих статус охраны ККРК; A – площадь ПК в км<sup>2</sup>. Индекс редкости видов (ИРВ) ККРФ в % рассчитан по той же формуле, но S – число видов, имеющих статус охраны ККРФ. Источником первичной информации стали инвентаризационные списки сосудистых растений ПК, опубликованные нами и данные других авторов, опубликованные позже (табл. 2).

При идентификации растений использовали флористические сводки (Вульф, 1927–1969; Определитель высших растений Крыма, 1972 под ред. Рубцова Н.И.; Определитель высших растений Украины, 1987; Флора европейской части СССР/ Восточной Европы, 1974–2004; Черепанов, 1995). В случаях смены концепции вида, а также разнотений в таксономии и номенклатурных решений в России и за рубежом, придерживались номенклатуры, используемой в ККРК (2015 г.). Учтены также другие современные публикации по систематике и флористике (Серёгин, 2004, 2007; Ільїнська, 2009; Рыфф, 2012, 2015, а, б; Каліста и др., 2013, 2015; Майоров, 1999; Кечайкин и др., 2018; Фатерыга, 2016; Фатерыга, 2019; Prina, 2009; Seregin, 2004, 2007, 2012; Shiyan, 2014; Fateryga A. и др., 2018). Латинские названия и объемы таксонов приводятся согласно современному чеклиству дикорастущих сосудистых растений Крыма (Ена, 2012). В списке РВ отделы растений перечислены в порядке от высших споровых к семенным. Таксоны ранга порядка, семейства и ниже (роды и виды в пределах семейств) расположены по алфавиту. В квадратных скобках указаны названия, под которыми виды приводились в опубликованных ранее конспектах флор и цитируемой литературе. По тексту статьи синонимы и авторы в названии таксона указаны только для растений, не включенных в списки охраняемых и неохраняемых видов (табл. 3, 9), а также при первом упоминании. Названия топонимов заимствованы из книг «Крым. Географические названия» (Белинский и др. 1998) и «Краткий географический словарь Крыма» (Ена В. и др., 2009).

В ходе полевых работ собрано более 4,5 тыс. листов гербария, основная часть которого находится в коллекции Карадагского природного заповедника (РНЕО) и гербария Главного ботанического сада РАН, Москва (МНА) (Миронова, Летухова, 2011). Учтены сборы Гербария Никитского ботанического сада (YALT), Института ботаники им. Н. Г. Холодного НАН Украины (KW), образцы гербария Биологического факультета Московского государственного университета (MW) и данные цифрового гербария MW (Seregin, 2018).

## Результаты и обсуждение

**Краткий обзор основных типов растительности изученных природных комплексов ЮВК.** В системе ботанико-географического районирования территории ЮВК относится к Судакско-Феодосийскому району Горнокрымского округа Крымско-Новороссийской провинции Евксинской (Эвксинской) подобласти Средиземноморья (Дидух, 1992). Растительность здесь имеет черты, характерные как для Крымского лесного среднегорья и предгорья, так и Крымского лесо-шиблякового субсредиземноморья (Ена и др., 2004). Примечательно, что восточнее ПК 1, в районе пгт Коктебель практически сходятся границы Южного берега Крыма, Горного Крыма и Крымской Лесостепи, а южная граница Крымской степи – находится практически рядом, севернее Феодосии. Расположение исследуемого региона на стыке разных природных зон способствовало развитию богатого и разнообразного растительного мира. На территории ЮВК отмечены почти все типы растительности, имеющиеся в пределах Крыма: лесная, кустарниковая, нагорно-ксерофитная, степная, саванноидная, прибрежная и водная (Рубцов, 1958, 1978).

Высокоствольные тенистые мезофитные и ксеромезофитные леса (лт, лто) занимают незначительные площади на территории ЮВК (ПК 1, ПК 5, ПК 6, ПК 8, ПК 10) и произрастают в относительно увлажненных условиях на достаточно богатых темно-бурых лесных почвах, формируя верхний пояс (выше 400 м н. у. м.) растительности (Шеляг-Сосонко, 1980). Дубово-ясеневые и грабовые леса распространены на склонах гор и хребтов северных экспозиций, по типологии они сходны с лесами северного склона Главной гряды (Ена и др., 2004; Дидух, 1992).

Основные лесообразующие породы в этих сообществах *Quercus petraea* Liebl., *Fraxinus angustifolia* Vahl. subsp. *oxycarpa* (Willd.) Franko et Rocha Afonso [*Fraxinus oxycarpa* Willd.], *Fraxinus excelsior* L., *Ulmus glabra* Huds., сопутствующие виды, обычно: *Acer hyrcanum* Fisch. et Mey. subsp. *stevenii* (Pojark.) E. Murr. [*Acer stevenii* Pojark.], *Quercus robur* L., *Sorbus torminalis* (L.) Crantz и др. В слабо выраженном кустарниковом ярусе встречаются *Carpinus orientalis* Mill., *Cornus mas* L., *Euonymus europaea* L., *E. latifolia* (L.) Mill., *E. verrucosa* Scop., *Corylus avellana* L., *Frangula alnus* Mill, обычен *Hedera helix* L. Сильноразреженный травяной покров слагают типичные лесные виды.

Представляют интерес редкие для ЮВК сообщества на бурых горнолесных почвах с доминированием *Fagus sylvatica* L. (ПК 6, ПК 10) и фрагменты леса с его участием в районе Водяной балки (ПК 6) и на вершине Эчкидага (ПК 8). Особо примечателен Агармышский буковый лес (ПК 5), находящийся в крайней восточной точке своего распространения в Крыму.

К самому распространенному типу лесной растительности в ЮВК относятся сообщества, с доминированием *Quercus pubescens* Willd. (лс, лсо), которые образуют нижний (до 400–500 м н. у. м.) лесной пояс в ЮВК (Шеляг-Сосонко, 1975, 1980). Мезоксерофитные дубово-грабинниковые достаточно светлые и низкорослые ценозы произрастают на бурых горнолесных почвах. Кроме доминанты *Quercus pubescens* в их составе присутствует *Acer campestre* L., *Carpinus betulus* L., *Ulmus minor* Mill. [*U. carpinifolia* Rupp. ex Suckow], *Sorbus torminalis*. На более сухих склонах возрастает участие в сложении древостоя *Carpinus orientalis*, *Paliurus spina-christi* Mill., в некоторых ценозах характерным компонентом является охраняемый вид *Juniperus deltoides*. Кустарниковый ярус формируют виды типа *Cornus mas*, *Jasminum fruticans* L., встречаются также *Cornus sanguinea* L. subsp. *australis* (C. A. Mey.) Jav. [*Swida australis* (C. A. Mey.) Pojark. ex Grossh.], *Rhamnus cathartica* L., *Ligustrum vulgare* L., *Rosa canina* L., *R. spinosissima* L. [*R. tschatyrdagii* Chrshan.].

Светлые сосновые леса на территории всех ПК отсутствуют, но имеются искусственные посадки охраняемого *Pinus brutia* и обычного для Крыма *Pinus nigra* J. F. Arnold subsp. *pallasiana* (Lamb.) Holmboe [*Pinus pallasiana* D. Don]. Посадки сосны осуществлялись в ЮВК с конца 1920-х годов прошлого века и в настоящее время довольно широко распространены на ПК 1, ПК 3 и ПК 8.

Характерным типом древесной растительности в ЮВК является северо-восточный вариант кустарниковых зарослей средиземноморской области с преобладанием гемиксерофитных и ксерофитных листопадных кустарников (кш, кшо), отнесенных Н.И. Рубцовым (1958) к типу «шибляк». Растительность шиблакового типа произрастает в основном на коричневых почвах, ниже 400 м н. у. м., занимая преимущественно склоны южных экспозиций, а также русла балок и долин (Рубцов, Ларина, 1975). В этом типе сообществ *Quercus pubescens* обычно формирует первый ярус, где содоминантами являются *Paliurus spina-christi*, *Carpinus orientalis*, местами к ним присоединяется *Juniperus deltoides*. Встречаются заросли кустарников *Paliurus spina-christi*, *Prunus spinosa* L. Сообщества шиблакового типа по составу древесных пород и видов, слагающих травянистый покров, схожи с дубово-грабинниковыми лесами, но в их древостое, преобладают кустарники: виды родов *Crataegus* и *Rosa*; обычны, но не обильны *Hippocratea emerus* (L.) Lassen subsp. *emeroides* (Boiss. et Sprun.) Lassen [*Coronilla emeroides* Boiss. et Sprun.], *Cotoneaster integrerrimus* Medik., *C. tauricus* Pojark., *Ligustrum vulgare*, *Clematis vitalba* L. иногда встречается *Berberis vulgaris* L., *Sambucus ebulus* L., *S. nigra* L., *Sorbus umbellata* (Desf.) Fritsch [*Sorbus graeca* (Spach) Lodd. ex Schauer, *Sorbus taurica* Zinserl.].

Гелиофитные, ксерофитные редколесья со степным травостоем (рд, рдо) занимают значительные площади в нижнем поясе растительности в ЮВК (Рубцов, 1956). В состав древостоя, помимо древесных пород, формирующих редколесье

(*Quercus pubescens*, *Pistacia mutica*, *Juniperus excelsa*, *Juniperus deltoides*), произрастают *Acer campestre*, *Carpinus orientalis*, *Fraxinus angustifolia* subsp. *oxycarpa*, *Pyrus communis* L., *P. elaeagrifolia* Pall., *Sorbus umbellata*. Ярус кустарников выражен слабо и включает виды, характерные для дубово-грабинниковых лесов и шибляковых сообществ. На каменистых участках по склонам гор и хребтов широко распространена *Cotinus coggygria* Scop.

Особую ценность представляют уникальные редколесья с доминированием *Pistacia mutica*, а также можжевеловые леса и редколесья из *Juniperus deltoides* и *Juniperus excelsa*, относящиеся к древней и исходной растительности полуострова (Малеев, 1933, 1948; Шеляг-Сосонко, Диух, 1975; Ларина, 1988), представляющие природный комплекс Средиземноморья Крыма. Можжевеловый лес и редколесья на Карадаге (ПК 1) с доминированием или участием можжевельника высокого имеют специфическую структуру и своеобразный облик, который придают им экзотические скалы руин стратовулкана юрского периода. Формация *Juniperus excelsa* является здесь самым восточным форпостом распространения по южнобережью Крыма. В районе пгт Краснокаменка (ПК 6) можжевеловый массив, находящийся на северной границе ареала произрастания вида в ЮВК, является одним из самых крупных (площадь более 450 га) можжевеловых насаждений Крымского лесного среднегорья, он не нарушен антропогенным воздействием и сохранился почти в первозданном виде.

Травянистые степные сообщества распространены по территории всех ПК, их наличие закономерно обусловлено как природными условиями, так и влиянием антропогенных факторов. Согласно географическому районированию Крыма (Дзен-Литовская, 1950; Лавренко, 1940), степные сообщества представлены ковыльно-злаковыми, бородачево-бедноразнотравными и дерновинно-злаковыми богаторазнотравными степями с каменистыми вариантами. По видовому составу и структуре травяная растительность ЮВК, напоминающая почти все подтипы степей, выделенные для Крыма, варьирует от луговых и настоящих степей до петрофитных и переходных к томиллярам ценозам.

Луговые степи (лс) – наиболее мезофильные травяные ценозы, занимают незначительные площади на территории ПК на черноземновидных, реже – темно-коричневых или каштановых почвах, преимущественно на северных и северо-восточных, относительно пологих склонах хребтов, а также встречаются в балках, ложбинах, на полянах и лесных опушках. Этот тип растительности характеризуется преобладанием в составе травостоя типичных элементов мезофильного и ксеромезофильного разнотравья, осок. Луговые степи отличаются довольно густым травостоем (проективное покрытие от 60–90% до 100%), а участие в их сложении полукустарничков, травянистых двудольных и однодольных эфемеров отличает их от равнинных луговых степей Европейской части России (Дзеволонский, 1926; Лавренко, 1956; Білик, Ткаченко, 1975). В структуре лугово-степных сообществ нередко присутствует ярус низких кустарников и полукустарников типа *Rosa gallica* L., *R. micrantha* Smith, *R. pygmaea* M. Bieb.

Степи настоящие, петрофитные и саванноидно-степные группировки произрастают в ксерофитных и мезоксерофитных условиях, на маломощных оstepненных коричневых щебенистых почвах, преимущественно в нижнем и среднем поясе растительности, покрывая некрутые склоны балок, долин и четвертичных террас.

Настоящие степи (сн) с проективным покрытием от 50 до 80% представлены в основном типчаково-ковыльными, ковыльно-злаковыми, разнотравно-злаково-типчаково-ковыльными, бородачево-бедноразнотравными сообществами. Наибольшие площади занимают степи типчаковые с доминированием формации *Festuca valesiaca* Gaudin и ковыльные, с доминированием видов рода *Stipa*. В сложении сообществ

настоящей степи принимает участие разнообразное ксерофильное и мезоксерофильное разнотравье и злаки. Ранней весной, в период достаточного увлажнения грунта, вегетируют многочисленные эфемероиды и эфемеры.

Петрофитные степи (сп) особенно широко распространены в ЮВК и встречаются на относительно крутых, щебнисто-каменистых прогреваемых склонах со смытыми или слаборазвитыми коричневыми почвами, в основном в верхней части склонов холмов и гор. Наиболее характерны для петрофитного типа растительности в ЮВК типчаково-чабрецовы и чабрецово-асфоделиновые степи. Довольно разреженный травостой (проективное покрытие от 30 до 50%) этих сообществ состоит из типичных степных злаков и многолетнего разнотравья, но в их сложении возрастает роль кустарничков и полукустарничков типа *Teucrium chamaedrys* L., *Teucrium capitatum* L. [ранее определялся как *T. polium* L.] (Tutin & Wood, 1972; Govaerts et al., 2005–2018), *Thymus tauricus* Klokov et Des.-Shost. Борадачевые степи с доминированием формации *Bothriochloa ischaemum* (L.) Keng., занимают промежуточное положение между настоящими и петрофитными степями, представляют средиземноморский тип растительности и довольно широко распространены на каменистых прогреваемых склонах в ЮВК.

Разнотравно-злаковые степи (рзн) довольно разнообразны по структуре и видовому составу, это преимущественно вторичные или производные ценозы нарушенных луговых или настоящих разнотравно-ковыльных степей после выпадения из их состава видов рода *Stipa*. Площади, занимаемые сообществами этого типа, расширяются в связи с увеличением антропогенных нагрузок в регионе на растительный покров под воздействием перевыпаса скота и вытаптывания.

На выпасаемых склонах нижней части гор и холмов, вдоль побережья в районе Тихой, Лисьей и Капсельской бухт, по днищу Баракольской котловины фрагментарно произрастают ксерофитные опустыненные и полупустынные степи на маломощных вариантах коричневых бескарбонатных почв, местами солончаковых и солонцеватых.

В составе этих типов степных сообществ характерно присутствие злаков *Poa bulbosa* L., видов рода *Elytrigia* (*Elytrigia obtusiflora* (DC.) Tzvelev [*E. elongata* (Host) Nevski], *E. repens* (L.) Nevski, *E. scythica*), а также разнотравья: полыней (*Artemisia austriaca* Jacq., *A. lerchiana* Stechm., *A. santonica* L. subsp. *santonica*, *A. scoparia* Waldst. et Kit., *A. taurica* Willd., *A. vulgaris* L.), молочаев (*Euphorbia agraria* M. Bieb., *E. falcata* L., *E. ledebourii* Boiss., *E. seguierana* Neck, *E. rigida*, *E. stricta* L.), кермеков (*Limonium gmelinii*, *L. platyphyllum* Lincz.). Местами обильно разрастается *Galatella villosa* (L.) Rchb. f. [*Crinitaria villosa* (L.) Grossh.], изредка встречается *Pholiurus pannonicus* (Host) Trin., немало эфемеров, сорных и полусорных растений.

Незначительные площади в районе Баракольской котловины, Двякорной бухты, на побережье морском и соленых озёр занимают редкие для ЮВК галофитные сообщества с проективным покрытием от 5 до 50%. Они формируются на солонцово-солончаковых почвах с сильным хлоридно-сульфатным засолением. На тяжёлых засоленных глинах, характерно произрастание галофитных сообществ с доминированием видов родов *Artemisia*, *Elytrigia* и *Limonium*, отмечается присутствие довольно редкого *Apera spica-venti* (L.) P. Beauv. subsp. *maritima* (Klokov) Tzvelev /*Apera maritima* Klokov/. В состав этого типа сообществ нередко входят злаки, выносящие засоление, полыни, разнообразные солянки: *Salsola laricina* Pall., *S. soda* L., *S. tragus* L. subsp. *tragus* /*S. australis* R. Br. p. p./, обычными компонентами являются *Camphorosma monspeliacaca* L., *Petrosimonia brachiata* (Pall.) Bunge, *P. oppositifolia* (Pall.) Litv., *Puccinellia fominii* Bilik., *Suaeda altissima* (L.) Pall., *S. salsa* (L.) Pall. и др., встречаются также *Juncus articulatus* L., *J. gerardii* Loisel. Галофитные ценозы с преобладанием солянок разрастаются в Баракольской котловине (ПК 4), где на участках, лишенных водного покрытия в период пересыхания озера формируется солончак.

Саванноидно-степные сообщества (сс) сформировались в основном на месте степей, нарушенных выпасом скота, рекреацией или на бывших пашнях (Рубцов, 1965). Доминирующее положение в их структуре занимают весной эфемеры, а в летний период разрастаются многолетние злаки и разнотравье, характерно для разнотравно-злаковых нарушенных степей.

Степные сообщества всех типов отличаются высокой мозаичностью, не имеют четких границ между собой и даже на ограниченном пространстве могут плавно сменять друг друга в зависимости от типа грунта, каменистости почв и увлажнения биотопа.

Фриганоиды (фр) или нагорные ксерофиты занимают хорошо прогреваемые, особо каменистые участки, скалы, осыпи, а также встречаются фрагментарно среди степных, шибляковых и саванно-степных ценозов (Рубцов, 1956, 1958). Растительный покров в сообществах этого типа сильно разрежен (ОПП не превышает 30–40%). В их состав входят разнообразные по сочетанию петрофитные элементы, но доминантное положение занимают ксерофитные и мезоксерофитные кустарнички. Широко распространены в этом типе растительности формации *Alyssum tortuosum* Waldst. et Kit. ex Willd., *Artemisia alpina* Willd., *Veronica multifida* L. subsp. *capsellicarpa* (Dubovik) A. Jelen. [*Veronica multifida* L.], виды рода *Thymus*. Для фриганоидов характерен очень разреженный ярус петрофитных кустарников: *Prunus tenella*, *Cotinus coggygria*, *Cotoneaster tauricus*, *Juniperus deltoides*, *Rhamnus cathartica* L.

Преобладание на территории ПК склоновых форм рельефа и скальных обнажений определили наличие сильно разреженных растительных группировок. В расщелинах скал, на обнажениях различных горных пород, каменистых осыпях (со) единично или небольшими куртинками закрепляются типичные петрофиты: *Arabis caucasica* Schlechtend, *Euphorbia petrophila* C. A. Mey., *Scrophularia rupestris*, *Seseli gummiferum* Pall. ex Smith. и др.

Разреженные растительные группировки (ркс) с проективным покрытием 10–40%, но чаще 10–15%, весьма разнообразные по структуре и видовому составу, занимают крутые открытые прогреваемые сухие склоны с подвижным глинисто-каменистым субстратом, со скелетными коричневыми почвами. На сильнокаменистых склонах, осыпях, встречаются не охраняемые, но достаточно редкие виды *Astrodaucus orientalis* (L.) Drude, *Asperula supina* M. Bieb. subsp. *supina* [*Asperula kotovii* Klokov], виды рода *Cephalaria* [*Cephalaria coriacea* (Willd.) Steud., *Cephalaria uralensis* (Murray) Roem. et Schult.], *Oxytropis pallasii* Pers, *Scrophularia canina* L. subsp. *bicolor* (Sibth. et Sm.) Greuter [*Scrophularia bicolor* Smith] и обычные *Bassia prostrata* (L.) Beck (*Kochia prostrata* (L.) Schrad), *Ephedra distachya* L, *Iberis simplex* DC. [*Iberis taurica* DC.].

Разреженные растительные группировки на каменисто-глинистых субстратах местами глубоко расчлененных эрозией склонов (ргс), также весьма разнообразны по видовому составу. В растительном покрове наряду с типичными петрофитами, встречаются виды, имеющие глубокую корневую систему, приспособленную к эрозионным склонам и экстремальным засушливым условиям произрастания.

Растительный покров морских береговых склонов ПК (ПК 1–3, ПК 7, ПК 8) имеет свою специфику. При удалении от побережья наблюдаются существенные различия в составе растительного покрова, как правило, сильно разреженного. Особый интерес представляют растительные группировки, фрагментарно распространенные в прибрежной литоральной полосе вдоль побережья от полуострова Меганом до мыса Святого Ильи (мп) и сохранившиеся в первозданном виде в наши дни на очень ограниченных участках Крымского побережья из-за тотальной застройки прибрежных земель. В числе обычных видов на побережье можно отметить *Cynanchum acutum* L., *Halocnemum strobilaceum* (Pall.) M. Bieb, *Juncus maritimus*, *Spergularia media* (L.) C. Presl /*Spergularia maritima* (All.) Chiov.

По берегам малочисленных в ЮВК водоемов, в руслах временных водотоков, на участках с дополнительным увлажнением вблизи источников или выходов грунтовых вод (увд), формируются сообщества, не отличающиеся большим видовым разнообразием и представляющие собой заросли трав: *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla [*Scirpus maritimus* L.], *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. *australis*, *Petrosimonia oppositifolia* (Pall.) Litv., *Puccinellia distans* (L.) Parl. Довольно редко в местах при повышенном увлажнении произрастают *Lythrum salicaria* L., *L. trilateatum*, *Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh. subsp. *uliginosa* Nyman [*P. uliginosa* Stev. ex DC.]. На участках с дополнительным увлажнением встречаются древесные растения: *Elaeagnus angustifolia* L., *Salix purpurea* L., *Tamarix ramosissima*, *T. tetrandra*. Площади, занятые растительностью такого типа, незначительны в засушливых условиях ЮВК.

Соотношение древесных закрытых и травяных открытых ценозов на исследуемых территориях ПК существенно различается. Леса занимают 70–85% площади на хр. Агармыш (ПК 5), в районе пгт Краснокаменка (ПК 6) и хр. Френк-Мезер (ПК 10); около 50% – на Карадаге и Эчкидаге (ПК 1, ПК 8). В районе Енишарских гор (ПК 2), хр. Узунсырт (ПК 4), полуострова Меганом (ПК 7) и Армутлукской долине (ПК 9) преобладают (70 до 80%) различные типы степных и нагорно-ксерофитных сообществ.

**Анализ флоры сосудистых растений природных комплексов Юго-Восточного Крыма.** Флора ЮВК характеризуется как наличием европейского степного и лесостепного элементов, так и присутствием видов Субсредиземноморья и Горного Крыма, которые находятся на северо-восточной границе своего распространения (Дидух, 1992). В составе флоры ПК ЮВК встречаются виды разных природных зон и экологической приуроченности; немало реликтовых, эндемичных и редких сосудистых растений.

Анализ данных флористических исследований и специальной литературы позволили составить список РВ 8-ми ПК ЮВК как имеющих статус охраны (табл. 3), так и не охраняемых, но редких для региона (табл. 9). Списки редкие видов ПК 9 и ПК 10 в данной работе не представлены, т. к. инвентаризация сосудистых растений этих территорий не завершена. Сведения, имеющиеся в настоящее время о редких охраняемых в ККРФ и ККРК видах (основная биоморфа, биотопическая приуроченность, созологический статус, распространение в пределах ПК, общая ориентировочная численность) приведены в табл. 3.

Общий список редких сосудистых растений 8-ми ПК с учетом данных ККРФ (2008) и ККРК (2015), включает 154 видов, относящихся к 44 семействам и 104 родам, что составляет (51,9) 52% от 297 таксонов сосудистых растений охраняемой флоры Крыма и 6,1% от 2536 видов и подвидов всей крымской флоры (Ена, 2012). В настоящее время два вида (*Blackstonia perfoliata*, *Teesdalia coronopifolia*), не учитывались при анализе флоры РВ ЮВК, поскольку они, возможно, исчезли или ошибочно приводились на территории ПК 1. Вызывает сомнение присутствие во флоре некоторых ПК еще 11 видов, не обнаруженных за последние 30 лет: *Arum italicum* (ПК 1), *Astragalus ponticus* (ПК 1), *Crambe pinnatifida* (ПК 1), *C. steveniana* (ПК 1), *Crataegus tournefortii* (ПК 1), *Epipactis palustris* (ПК 1, ПК 8), *Nitraria schoberi* (ПК 1), *Orchis militaris* (ПК 1), *Rumex scutatus* subsp. *hastifolius* (ПК 1), *Verbascum pinnatifidum* (ПК 1), *Sedum rubens* (ПК 1).


За период после публикации конспектов флор (1995–2015 гг.) было установлено произрастание таких редких видов как *Epipactis krymmontana* на территории ПК 1 (Фатерыга А., Фатерыга В., 2016), *Anthericum liliago* на территории ПК 8 (Рыфф, 2012). В мае 2018 г. на северном предвершинном склоне г. Сандык-Кая (ПК 6), вблизи массива высокоствольного ясенево-скальноводного леса на крупнокаменистой осыпи при дополнительном увлажнении краеведом-любителем В.М. Анваровым отмечена пока

единственная в ЮВК популяция *Gladiolus imbricatum* (ПК 6), численностью более 100 разновозрастных особей. Большой интерес представляют популяции *Tulipa biflora*, произрастающие вдалеке от морского побережья. В 2009 году В.М. Анваровым этот вид был обнаружен на известняковом, каменистом участке в предвершинной части хр. Гондарлы-Кая (ПК 6), на расстояние около 6 км от Черноморского побережья, в составе нагорно-ксерофитного сообщества. В апреле 2019 года в пределах ПК 10, этим же краеведом отмечено 3 фрагмента популяции *Tulipa biflora* на склонах холмов в центре Армутлурской долины среди разреженного степного травостоя в 3-х км от северо-западной границы Карадагского заповедника (ПК 1) и в 3,5 км от морского побережья. В список охраняемых видов на основании гербарных образцов коллекции МГУ (MW), внесен ранее, по-видимому, пропущенный однолетник *Buglossoides tenuiflora*.<sup>11</sup>

Более половины охраняемых видов (89) относятся к 8 семействам, что составляет 58,4% от общего числа таксонов, имеющих созологический статус. В числе этих семейств: Orchidaceae (27 видов), Poaceae (13), Fabaceae (12), Brassicaceae (11), Apiaceae (7), Caryophyllaceae (7), Rosaceae (6), Asparagaceae (6).

**Виды, имеющие статус охраны, преимущественно многолетние растения, в их числе деревья (Д) – 4, кустарники (К) – 2, виды, произрастающих в форме как дерева, так и кустарника (Д-К) – 7, полукустарники (Пк) – 1, кустарнички (Кч) – 2, полукустарнички (Пкч) – 15, поликарпические травы (Пол) – 104. Два вида могут иметь форму как поликарпической травы, так и монокарпической: *Allium siculum* subsp. *dioscoridis* [*Nectaroscordum meliophilum*] (Миронова, Шатко, 2011 б), *Glaucium flavum* (Фатерыга, 2018).**

Малолетних и однолетних трав в списке РВ всего 17 (18): 3 монокарпика (Мал.), 13 (14) однолетников озимых и яровых (Оз. Одн., Яр. Одн.), 1 (*Astrodaucus litoralis*) монокарпик или однолетник, что составляет среди охраняемых видов 12,3% (рис. 2).



**Рис. 2.** Соотношение числа охраняемых сосудистых растений разных жизненных форм, %

Незначительное число однолетних и малолетних растений среди охраняемых видов, по-видимому, связано с тем, что они реже попадают в поле зрения ботаников при маршрутном обследовании территории. Среди однолетних видов преобладают эфемеры и растения, численность которых колеблется по годам в зависимости от гидротермических условий сезона и состояния биотопа. Данные о числе мест произрастания и численности популяций таких таксонов при одноразовом обследовании территории выявить сложно, поэтому существует реальная опасность потери видов именно в этих группах растений.

На основе существующих в настоящее время флористических материалов проведена сравнительная оценка природных комплексов ЮВК по общему числу видов

сосудистых растений, произрастающих на их территории и наличию в составе флоры редких и эндемичных растений.

За период после публикации конспектов флор ПК ЮВК (1995–2015 гг.) списки сосудистых растений ПК ЮВК неоднократно дополнялись и корректировались в связи с обнаружением новых для территорий ПК видов, изменениями в понимании объема таксонов, переходом крымских ботаников от монотипической концепции вида к политипической (Ена, 2012). Более всего претерпели преобразования конспекты флор ПК 1, ПК 2, ПК 6, поскольку их территории чаще посещались ботаниками и краеведами. Общее число видов сосудистых растений ПК 1 в настоящее время, по нашему мнению, достигло 1183 вида, а не 1200, как предполагается авторами последней публикации (Фатерыга, 2019). При определении общего числа сосудистых растений на территории ПК 1, учтены обнаруженные за этот период 22 новых таксона (включая редкий *Scabiosa praemontana* Privalova), 3 вида из старых гербарных сборов Д.П. Сырейщиковой (Фатерыга, 2019). Исключено из списка флоры заповедника 13 видов растений, в том числе редкие: *Blackstonia perfoliata*, *Crambe aspera*, *Teesdalia coronopifolia*. Не включены во флористический список виды на основании гербарных сборов с территории Карадага почти 100-летней давности и гибриды, наличие которых не подтверждалось после их первоначальных сборов. Учитывая мощное антропогенное воздействие на территорию ПК 1 до организации заповедника и климатические изменения, произрастание этих таксонов в настоящее время сомнительно.

Общее число видов сосудистых растений изменилось и на других ПК ЮВК. В результате списки высших сосудистых растений пополнились на территории ПК 1 на 19 видов, ПК 2 на 21 вид, ПК 6 на 82, ПК 7 на 3, ПК 8 на 3 таксонов. Сравнительная оценка флористического разнообразия ПК ЮВК приведена в таблице 4.

**Таблица 4.**  
**Сравнительная оценка флористического разнообразия ПК ЮВК по общему числу сосудистых растений и числу редких охраняемых таксонов**

№ Природного комплекса (ПК)							
1	2*	3	4	5**	6	7	8
Общая площадь ПК в км <sup>2</sup> (A)							
21	16	29	18	38	28	27	23
Число видов сосудистых растений ПК							
1183	671	966	769	834	886	892	918
Число видов сосудистых растений на 1 км <sup>2</sup>							
56,3	41,9	33,3	42,7	21,9	31,6	33,0	39,9
Число редких видов сосудистых растений ККРК во флоре ПК (S)							
118	89	90	70	65	86	87	101
Число редких видов сосудистых растений ККРК на 1 км <sup>2</sup> ПК							
5,6	5,6	3,1	3,9	1,7	3,1	3,2	4,4
% редких видов ККРК от числа сосудистых растений ПК							
10,1	13,4	9,3	9,2	7,7	9,7	9,6	10,9
Индекс редкости видов ККРК - ИРВ в %*							
0,48	0,84	0,32	0,51	0,20	0,35	0,36	0,47
Число редких видов сосудистых растений ККРФ во флоре ПК							
41	30	33	26	27	34	29	40
Число редких видов сосудистых растений ККРФ на 1 км <sup>2</sup> ПК							
2,0	1,9	1,1	1,4	0,7	1,2	1,1	1,7
% редких видов ККРФ от числа сосудистых растений ПК							
3,5	4,5	3,4	3,4	3,2	3,8	3,3	4,4

Продолжение таблицы 4.

Индекс редкости видов ККРФ - ИРВ в %*							
0,17	0,28	0,12	0,19	0,09	0,14	0,12	0,19
Число охраняемых крымских эндемиков (ЭК)							
17	13	10	10	10	15	13	14
Число охраняемых ЭК на 1 км <sup>2</sup> ПК							
0,8	0,8	0,3	0,6	0,3	0,5	0,5	0,6
% охраняемых ЭК от числа сосудистых растений ПК							
1,5	1,9	1,0	1,3	1,2	1,7	1,5	1,5

Примечания: \*Данные по флоре ПК 2 представлены Беляниной Н.Б. и Шатко В.Г. (Белянена, Шатко, 1998, 2000), по ПК 5 – Каменских Л.Н. (Каменских, 2011); \*\* при оценке видового флористического разнообразия территории и определении индекса редкости видов не учитывали 2 вида, интродуцированные на территорию Карадагского заповедника. Методы расчета индексов ИРВ изложены в разделе «Материалы и методы исследований».

На территориях ПК ЮВК отмечено от 26 (ПК 4) до 41 (ПК 1) вида из Красной книги Российской Федерации (2008), число таксонов, включенных в ККРК, колеблется в пределах от 65 (ПК 5) до 101 (ПК 8) и 118 (ПК 1). Самое высокое видовое разнообразие и число видов на 1 км<sup>2</sup> отмечены на территории ПК 1, ПК 2, ПК 4. Это связано как со спецификой природных условий, разнообразием биотопов и размеров ПК, так и степенью изученности этих территорий. Наблюдается снижение числа редких видов на 1 км<sup>2</sup> при увеличении площади ПК, поэтому наименьшего значения эти параметры достигают на территории хр. Агармыш (ПК 5) (табл. 4). Наибольшее значение индекса редкости зарегистрировано на Карадаге, Енишарах, Узунсырте и Эчкидаге (ПК 1, ПК 2, ПК 4, ПК 8). Значимость и достоверность данных полученных с использованием выше указанных параметров в значительной степени зависит от тщательности проведения инвентаризационных работ, полноты и точности составленных флористических списков. При наличии максимально полных списков сосудистых растений создается возможность осуществлять сравнительный анализ флор ПК не только в пределах одного региона, но и разных физико-географических зон (Миронова, 2017а).

В числе видов, включённых в Красные книги РФ и РК, 64 сосудистых растений (42,1%) имеют охранные статусы и другого уровня. В Европейском Красном списке животных и растений (ЕКС 1998 и 2011 гг.) значится 52 вида; 29 таксонов включено в список Конвенции по международной торговле видами дикой флоры и фауны (СИТЕС), 1 вид в дополнение 2 к СИТЕС; 9 – в список Бернской конвенции (БК), 1 – в исправленное дополнение к Бернской конвенции (ДБК), 6 – в Красную книгу Черного моря (табл. 3, 4).

Показателями специфиности и своеобразия флоры можно считать наличие и число в ее составе эндемичных растений. В результате ревизии крымского флористического эндемизма (Ена, 2001, 2002) во флоре Крыма число эндемиков снизилось до 106 видов и подвидов, из которых менее половины (40 видов, 38%), в настоящее время имеют охранный статус ККРФ и ККРК; в их числе 21 видов произрастает на территории исследованных ПК ЮВК, что составляет около 19,8% от общего числа эндемиков Крыма и 52,5% от охраняемых. Число охраняемых эндемичных растений в отдельных ПК колеблется от 10 (ПК 3–5) до 17 (ПК 1), процент охраняемых ЭК от числа сосудистых растений самый низкий отмечен на территории ПК 3, самый высокий на территории ПК 2 и ПК 6 (табл. 3, 4).

Список редких видов ПК ЮВК претерпел значительные изменения после издания ККРК (2015) в сравнении с предыдущими сводками о редких видах (Миронова, Шатко, 2004, 2011б; Миронова и др. 2008, 2012). Впервые получили государственный охранный статус 30 видов, произрастающих на территории изученных ПК. В их числе оказались растения, имеющие широкое распространение в Крыму и произрастающие достаточно многочисленными популяциями: *Capparis herbacea* (ПК 1–10), *Genista*

*albida* (ПК 1–10), *Iris pumila* (ПК 1–10), *Hesperis steveniana* (ПК 1, ПК 5, ПК 6, ПК 8, ПК 10), *Linum pallasianum* (ПК 1–10), *Paronychia cephalotes* (ПК 1–10), *Sideritis syriaca* (ПК 1–10) и др. Необходимо отметить, что, несмотря на высокую численность популяций этих растений на территории Крыма, включение их в ККРК вполне обосновано, поскольку эти виды нередко имеют важную ценообразующую роль в сложении сообществ, являются доминантами или содоминантами, в их числе: *Asphodeline taurica* (ПК 1–8, ПК 10), *Juniperus deltoides* (ПК 1, ПК 5–8, ПК 10), *Hedysarum tauricum* (ПК 1–10), *Scilla bifolia* (ПК 1–10), *Stipa capillata* (ПК 1–10) и др.

Ограниченнное число мест произрастания или невысокая численность популяций в ПК ЮВК характерна для ранее не охраняемых видов: *Argusia sibirica* (ПК 2, ПК 3, ПК 7, ПК 8), *Anthericum liliago* (ПК 8), *Cakile maritima* subsp. *euxina* (ПК 1–3, ПК 7, ПК 8), *Krascheninnikovia ceratoides* (ПК 2–4, ПК 7, ПК 8), *Ferula caspica* (ПК 2–4, ПК 7), *Prangos trifida* (ПК 2), *Rindera tetraspis* (ПК 2, ПК 4), *Sedum rubens* (ПК 1, ПК 6, ПК 7), *Trachomitum venetum* (ПК 2, ПК 3, ПК 7), *Satureja montana* subsp. *taurica* (ПК 5, ПК 8), *Scilla sibirica* (ПК 5) и др.

Материалы наших многолетних флористических исследований дали дополнительную информацию о распространении видов в ЮВК. В некоторых очерках ККРК отсутствовали указания на присутствие во флоре изученных ПК ряда видов, или приведены сведения о том, что в настоящее время их произрастание не подтверждено. Нами подтверждены или зафиксированы ранее не отмеченные места произрастания для *Arum italicum* subsp. *albispithum* (ПК 5, ПК 6), *Astrodaucus littoralis* (ПК 1–3, ПК 7, ПК 8), *Conringia clavata* (ПК 1, ПК 2, ПК 4, ПК 7), *Crithmum maritimum* (ПК 7), *Eryngium maritimum* (ПК 7), *Heracleum ligusticifolium* (ПК 6, ПК 8), *Allium nathaliae* (ПК 5), *Asparagus maritimus* (ПК 3, ПК 7), *Scabiosa praemontana* (ПК 1–3, ПК 5–8), *Scilla siberica* (ПК 5), *Anacamptis pyramidalis* (ПК 7), *Cephaelanthera damasonium* (ПК 3, ПК 7), *C. longifolia* (ПК 5, ПК 6), *C. rubra* (ПК 5), *Dactylorhiza romana* (ПК 5, ПК 6), *Limodorum abortivum* (ПК 7), *Neottia nidus-avis* (ПК 1, ПК 5, ПК 6), *Neottia ovata* (ПК 5, ПК 8), *Platanthera bifolia* (ПК 3), *Steveniella satyrioides* (ПК 5, ПК 6), *Anthemis sterilis* (ПК 5), (Дидух, 1981), *Onosma polyphylla* (ПК 2–4) и др. (табл. 3).

Дополнительное представление о пространственном распространении видов в ЮВК можно получить при анализе данных их встречаемости в пределах конкретных ПК. Во флоре всех 8-ми ПК произрастает 27 видов (18%) охраняемых растений: *Adonis vernalis*, *Anacamptis morio*, *A. pyramidalis*, *Crataegus sphaenophylla*, *C. taurica*, *Genista albida*, *Hedysarum candidum*, *H. tauricum*, *Onobrychis pallasii*, *Orchis purpurea*, *O. simia*, *Paeonia tenuifolia*, *Paronychia cephalotes*, *Rumia crithmifolia*, *Salvia scabiosifolia*, *Scilla bifolia*, *Stipa pulcherrima* и др. На территории 7-ми ПК отмечено 18 видов, 13 видов произрастают в растительном покрове 6-ти ПК, 18 – в 5-ти ПК, 21 – в 4-х ПК (табл. 3).

Зафиксировано произрастание 17 редких таксонов на территории 3-х ПК: *Asphodeline lutea* (ПК 5, ПК 6, ПК 10), *Cerastium biebersteinii* (ПК 1, ПК 6, ПК 8), *C. bulgaricum* (ПК 1, ПК 6, ПК 8), *Elytrigia stipifolia* (ПК 1, ПК 2, ПК 8), *Elytrigia strigosa* (ПК 1, ПК 4, ПК 5), *Epipactis microphylla* (ПК 1, ПК 6, ПК 8), *Neottia nidus-avis* (ПК 1, ПК 5, ПК 6), *Trachomitum venetum* (ПК 2, ПК 3, 8) и др. В пределах только двух ПК из 8-ми, отмечено 20 видов: *Arum italicum* subsp. *albispithum* (ПК 5, ПК 6), *Asparagus maritimus* (ПК 3, ПК 7), *Brassica cretacea* (ПК 3, ПК 4), *Crambe pinnatifida* (ПК 1, ПК 7), *Crataegus tournefortii* (ПК 1, ПК 5), *Crithmum maritimum* (ПК 1, ПК 7), *Cleome ornithopodioides* subsp. *canescens* (ПК 1, ПК 3), *Lepidium turczaninowii* (ПК 3, ПК 9), *Platanthera bifolia* (ПК 3, ПК 8), *Heracleum ligusticifolium* (ПК 6, ПК 8), *Neottia ovata* (ПК 5, ПК 8), *Ophrys apifera* (ПК 3, ПК 6), *Rindera tetraspis* (ПК 2, ПК 4), *Rumex scutatus* subsp. *hastifolius* (ПК 1, ПК 4), *Steveniella satyrioides* (ПК 5, ПК 6), *Satureja montana* subsp. *taurica* (ПК 5, ПК 7), *Tulipa sylvestris* subsp. *australis* (ПК 2, ПК 6), *Sedum rubens* (ПК 6, ПК 7) и др. Только на территории одного ПК зарегистрировано произрастание 19 видов: *Allium siculum* subsp. *dioscoridis* (ПК 1), *Anthericum liliago* (ПК 8), *Avena barbata*

(ПК 7), *Coeloglossum viride* (ПК 5), *Epipactis krymmontana* (ПК 1), *E. palustris* (ПК 6), *Gagea bulbifera* (ПК 2), *Gladiolus imbricatum* (ПК 6), *Globularia trichosantha* (ПК 5), *Notholaena marantae*. (ПК 1), *Orchis militaris* subsp. *stevenii* (ПК 3), *Phelypaea coccinea* (ПК 4), *Prangos trifida* (ПК 2), *Rhaponticooides taliewii* (ПК 4), *Scilla siberica* (ПК 5), *Sternbergia colchiciflora* (ПК 3), *Triticum boeoticum*. (ПК 3), *Vitex agnus-castus* (ПК 7) (табл. 3). Особо ценна находка в начале июня 1996 года малочисленной популяции (7-ми разновозрастных особей) *Comperia comperiana* (Миронова, 1999а; Миронова, Шатко, 2001), у подножья приморского склона Эчкидага, в средней части Сухого оврага Лисьей бухты, вблизи ручья, среди разнотравно-злакового травостоя на поляне сильно разреженного кустарникового сообщества (ПК 8).

Вид – это система ценопопуляций, поэтому для оценки его состояния и перспектив сохранения важна информация о числе популяций, возрастной структуре и численности особей в них. На исследуемой территории ПК имеются данные о численности популяций только для 43 видов. Малочисленными популяциями (до 10 особей) в пределах некоторых ПК в ЮВК представлены 15 таксонов: *Arum italicum* subsp. *albispodium*, *Comperia comperiana*, *Epipactis krymmontana*, *Neottia ovata* и др.

Популяциями численностью не более 100 особей в условиях ПК произрастает 20 видов, в их числе *Brassica cretacea*, *Cakile maritima*, *Crambe pinnatifida*, *Crataegus tournefortii*, *Cephalanthera damasonium*, *C. longifolia*, *C. rubra*, *Cerastium bulgaricum*, *Epipactis helleborine*, *E. microphylla*, *Euphorbia rigida*, *Dactylorhiza romana*, *Heracleum ligusticifolium*, *Neottia nidus-avis*, *Ophrys apifera* (Летухова, Потапенко, 2017), *Trachomitum venetum*.

С численностью до 500 экз. разновозрастных особей описано 19 популяций РВ: *Cleome ornithopodioides* subsp. *canescens*, *Gladiolus imbricatum*, *Ophrys oestrifera*, *Orchis punctulata*, *Orchis purpurea*, *Glaucium flavum*, *Platanthera chlorantha* и др. Для 11 видов характерно произрастание популяциями численностью до 1000 экз., которая, впрочем, незначительно колеблется по годам. Наблюдается возрастание числа особей в популяциях, появление новых мест обитания для 12 видов растений: *Anacamptis morio*, *A. pyramidalis*, *Orchis simia*, *Neotinea tridentata*, *Himantoglossum caprinum* и др. Состояние популяций 23 видов можно оценить как нормальное, их численность высока (более 1000 экз. особей), колебания численности особей незначительны, а число мест произрастания относительно стабильно.

**Особенности распространения охраняемых сосудистых растений по основным биотопам в пределах природных комплексов ЮВК.** Пространственное переплетение климатических зон (горных лесов, степей, сухих субтропиков), почв (коричневых, бурых, горнолесных, черноземных и др.), сложный рельеф ПК способствуют дифференциации растительного покрова, обусловливают произрастание видов разной биотической приуроченности на сравнительно небольшой территории ПК ЮВК

В настоящее время научно обосновано, что сохранение фитоценотического разнообразия, включая редкие таксоны, возможно лишь при сбережении мест произрастания видов, т. е. биотопов со всем набором биотических и абиотических параметров их характеризующих. В Европе разрабатываются различные варианты классификации биотопов, в числе которых в настоящее время наиболее совершенной является EUNIS Habitat Classification (Davies et al., 2004). На этой классификации базируется существующая и перспективная природоохранная система континента (Рыфф, 2017 а). Перечень биотопов Европы, находящихся под угрозой исчезновения и выделенных на основании этой классификации, утвержден Приложением 1 к Резолюции № 4 Бернской конвенции («Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе»), но в нем не полностью представлено все многообразие биотопов Крымского полуострова. В Крыму, включая его юго-восточную часть, работы по классификации биотопов, по мнению Л.Э. Рыфф, находятся на начальной стадии, но публикации по этой теме для ЮВК уже имеются (Рыфф, 2017а, б).

Безусловно, классификация биотопов Юго-восточного Крыма, в связи с разнообразием и спецификой природных условий региона, требует углубленных и целенаправленных исследований. В данной публикации, ввиду того, что система классификации европейских биотопов EUNIS (Davies et al., 2004) не завершена, ограничиваемся общей их характеристикой на высшем уровне иерархии и не ставим цель – определение места выделенных нами биотопов в системе Европейской классификации биотопов. Биотоп в данной работе трактуется, согласно Б.М. Миркину и Г.С. Розенбергу (1983), как участок пространства со свойственным ему комплексом абиотических и биотических условий и являющийся элементарной единицей системы природных территорий. Непосредственные наблюдения за состоянием растений в местах произрастания с различными биотическими и абиотическими условиями дали возможность определить приуроченность и предпочтение РВ к конкретным биотопам. В пределах, исследованных ПК нами условно выделены 22 биотопа, краткая характеристика которых приводится в табл. 5.

**Таблица 5.  
Основные биотопы с редкими охраняемыми видами на территории ПК ЮВК**

№	Характеристика биотопа	*УБ
1	Мезофитные и ксеромезофитные тенистые высокоствольные леса с разреженным травостоем из лесных видов в верхнем высотном поясе гор на богатых бурых горнолесных почвах	лт
2	Опушки и поляны тенистых высокоствольных лесов с лесной или луговой травяной растительностью на бурых горнолесных или луговых черноземовидных почвах	лтп
3	Мезоксерофитные среднерослые и низкорослые светлые леса в среднем и нижнем высотном поясе хребтов и гор на бурых горнолесных почвах	лс
4	Опушки и поляны мезоксерофитных среднерослых и низкорослых светлых лесов со степной и лугово-степной растительностью на луговых черноземовидных почвах	лсп
5	Средиземноморско-Эвксинские и Понто-Сарматские мезоксерофитные заросли листопадных кустарников и шибляковые низкорослые дубово-грабинниковые сообщества в среднем и нижнем высотном поясе хребтов и гор, а также в балках и оврагах на бурых горнолесных или коричневых почвах	кш
6	Опушки и поляны мезоксерофитных зарослей листопадных кустарников и шибляковых низкорослых дубово-грабинниковых сообществ с мезоксерофитной степной и лугово-степной растительностью на коричневых почвах	кшп
7	Гелиофитные, ксерофитные редколесья с доминированием <i>Juniperus excelsa</i> и <i>Juniperus deltoides</i> [ <i>Juniperus oxycedrus</i> ], <i>Pistacia mutica</i> , <i>Quercus pubescens</i> (можжевеловое, фисташково-можжевеловое, дубово-фисташковое, дубовое) на коричневых почвах	рд
8	Опушки и поляны гелиофитных и ксерофитных редколесий с остеиненным травостоем на коричневых почвах	рдп
9	Ксеромезофитная луговая степь на различных стабильных субстратах с развитыми черноземовидными лугово-степными почвами	сл
10	Ксерофитная настоящая степь (типчаковая, ковыльная, бородачевая) с сомкнутым травостоем, хорошо развитой дерниной на различных стабильных, субстратах с развитыми, преимущественно коричневыми, почвами	сн
11	Ксерофитные петрофитные степи с несомкнутым или слабо сомкнутым покровом: асфоделиновые (с участием или доминированием <i>Asphodeline taurica</i> ), бородачевые (с доминированием <i>Bothriochloa ischaemum</i> ), разнотравно-злаковые (обычно участие полукустарничков и кустарничков) на каменистых и щебнистых прогреваемых склонах со смытыми или слаборазвитыми коричневыми почвами, а также на глинистых продуктах выветривания известняков, песчаников, конгломератов и других горных пород	сп

Продолжение таблицы 5.

12	Мезоксерофитные разнотравно-злаковые сообщества на коричневых почвах и типчаково-крымскополынныне стени на тяжёлых глинах, нередко ранее нарушенные выпасом скота	рзн
13	Опустыненные стени с доминированием рода <i>Artemisia</i> и <i>Galatella villosa</i> на маломощных солончаковых и солонцеватых вариантах коричневых почв и галофитные сообщества с доминированием видов родов <i>Elytrigia</i> и <i>Limonium</i> на тяжёлых засоленных глинах.	огс
14	Ксерофитные саванноидно-степные сообщества однолетников средиземноморского происхождения или вторичные на месте степных в нижнем высотном поясе хребтов и гор на коричневых почвах	сс
15	Фриганоидные ксеро-термофильные сообщества на особо каменистых участках, осыпях различных типов пород, на сильно структурированных скелетных, преимущественно бескарбонатных, коричневых почвах	фр
16	Не сомкнутые ксерофитные петрофитные растительные группировки (пионерные) однолетников-эфемеров и многолетников, а также единичные хазмофиты субгоризонтальных поверхностей скал, каменистых обнажений, щебенистых осыпей из разных пород (магматических, конгломератов, рифогенных верхнеюрских известняков и т. д.)	со
17	Разреженная полукустарничковая ксеро-термофильная растительность на крутых открытых эрозионных склонах гор, хребтов, балок, на подвижном каменистом субстрате (осыпях), флишевых обнажениях из разных горных пород со скелетными коричневыми почвами	ркс
18	Разреженная ксеро-термофильная растительность открытых эрозионных склонов разной крутизны гор, хребтов, балок, на подвижном глинистом субстрате (включая бедленды), обнажениях глинистых сланцев таврической серии, тяжелых юрских и меловых глинах	ргс
19	Термофильная сильно разреженная растительность приморских глинисто-каменистых склонов, скальных обрывов, щебенистых осыпей из продуктов выветривания глинистых сланцев	пкс
20	Сильно разреженная ксерофитная (солончаковая) степная, галофитная и псаммофитная растительность на каменисто-глинистых и сланцевых приморских обрывах (включая бедленды), береговых клифах, абразионных морских террасах в зоне воздействия морского аэрозоля на коричневых солончаковых и солонцеватых почвах и засоленных глинах	пгсэ
21	Фрагментарно встречающаяся однолетняя и многолетняя галофитная, псаммофитная, гало-нитрофитная растительность песчаных и галечниковых пляжей морского побережья, включая сообщества приморских дюн	мп
22	Мезофитная галофильная растительность берегов водоемов, ручьев, прудов, русел временных водотоков, мест с дополнительным увлажнением (включая выходы грунтовых вод), пересыхающих и непересыхающих внутренних озер, включая пересыхающее солёное оз. Бараколь	увд

Примечание: \* УБ – условные обозначения, используемые в таблице 3.

Распространение и численность РВ в пределах ПК определяется площадью его фитоценотического ареала, размером экологической амплитуды, наличием соответствующих экотопических условий и числом разных типов экотопов, в которых вид может произрастать.

В лесных тенистых высокоствольных сообществах (лт) ПК ЮВК встречается 43 РВ. В составе древостоя отмечается присутствие охраняемого вида *Tilia dasystyla*. В травяном ярусе, под пологом деревьев, произрастает 18 видов, внесенных в ККРК, но только 5 из них, практически, не выходят из под полога деревьев на поляны и опушки, в числе которых *Allium siculum* subsp. *dioscoridis* (ПК 1). В виде малочисленных популяций в этом типе леса произрастает *Arum italicum* subsp. *albispithum*,

*Coeloglossum viride* (ПК 5), *Steveniella satyrioides* (ПК 5, ПК 6). На полянах и опушках различных типов тенистых лесных сообществ (лтп) в составе лесного, лугового и лугово-степного разнотравья отмечено 26 редких видов (табл. 3) Только в затененных и относительно увлажненных местах различных лесных сообществ встречаются *Epipactis helleborine* subsp. *levantina* (ПК 1, ПК 5, ПК 6, ПК 8), *E. krymmontana* (ПК 1).

В светлых и низкорослых дубовых лесах (лс) произрастает 63 редких таксона. В древесный ярус входит 6-ть РВ: *Crataegus taurica*, *Juniperus deltoides*, *J. excelsa*, *Pistacia mutica*, *Tilia dasystyla*. В травостое под кронами деревьев отмечено 24 вида. На опушках и полянах среди лугово-степного и степного травостоя (лсп) встречается 39 редких таксона, большинство из которых отмечено и в других типах мезофитных и ксеромезофитных травяных сообществах.

В светлых лесах, как под пологом деревьев, так и на полянах произрастают малочисленными популяциями *Ophrys apifera* (ПК 3, ПК 6), *Op. oestrifera* (ПК 1, ПК 3, ПК 6, ПК 8), *Orchis mascula* (ПК 1, ПК 2, ПК 5, ПК 6, ПК 8), *O. militaris* subsp. *stevenii* (ПК 3), *O. punctulata* (ПК 1 - 6, ПК 8).

Как пологом деревьев, так и на полянах и опушках тенистых и светлых лесов встречаются *Cephalanthera rubra* (ПК 1, ПК 5, ПК 6, ПК 8), *C. damasonium*, *C. longifolia*, *Colchicum umbrosum*, *Crocus speciosus*, *Dactylorhiza romana* (ПК 1, 5, 6), *Limodorum abortivum* (ПК 1, ПК 4-8), *Neottia nidus-avis* (ПК 1, ПК 5, ПК 6), *N. ovata* (ПК 5, ПК 8), *Orchis purpurea* (ПК 1-8), *Scilla siberica* (ПК 5). Преимущественно на полянах и опушках различного типа лесных сообществ, при относительном затенении отмечено присутствие *Epipactis microphylla* (ПК 1, ПК 6, ПК 8), *Geranium tuberosum*, *Platanthera bifolia* (ПК 3-8), *Pl. chlorantha* (ПК 1-6, ПК 8).

В увлажненных и умеренно затененных биотопах древесных сообществ, можно встретить крайне редкие для ЮВК *Atropa bella-donna* (ПК 5, ПК 8) и *Epipactis palustris* (ПК 6). Типичными представителями всех типов лесов в ЮВК являются *Galanthus plicatus*, *Paeonia daurica*, *Scilla bifolia* – виды, произрастающие многочисленными популяциями (табл. 3).

В сообществах шиблякового типа (кш) зафиксировано 52 РВ. В древесном ярусе примечательно присутствие редких краснокнижных видов боярышника: *Crataegus karadaghensis*, *C. meyeri*, *C. orientalis* subsp. *pojarkovae*, *C. sphaenophylla*, *C. taurica* и особо редко встречающегося единично или малочисленными популяциями *Crataegus tournefortii* (ПК 1, ПК 5). В составе травостоя этого типа сообществ отмечено 33 охраняемых вида, которые обычно произрастают также на опушках и полянах светлых лесов и редколесий (табл. 3).

В флористическом составе различных вариантов дубовых, фисташковых, можжевеловых редколесий (рд) отмечено 40 видов ККРК. В древесном ярусе встречается 12 РВ. В травостое редколесья (рдп) присутствуют 28 редких охраняемых таксонов, характерных также для травяного яруса светлых низкорослых лесов, шибляковых ценозов и различных типов степных сообществ (табл. 3).

В светлых лесах и редколесьях, среди кустарников примечательны заросли *Hesperis steveniana*. В редколесье и на полянах светлых дубовых лесов растут *Astragalus ponticus*, *A. suprapilosus*, *A. testiculatus*, *Cerastium bulgaricum*, *Conringia clavata*, *Crocus pallasii*, *Hedysarum candidum*, *Lens ervoides*, *Vicia ervilia*. На известковых каменистых склонах в разреженном пущистодубово-грабинниковом лесу шиблякового типа описана единственная пока в ЮВК популяция *Anthericum liliago* (ПК 8) (Рыфф, 2012).

В составе различных типов степей (луговым, настоящим, петрофитным) произрастает 49 таксонов, включённых в ККРК. Преимущественно в травостое луговой степи (сл) встречается 16 РВ: *Adonis vernalis*, *Anacamptis morio* subsp. *caucasica*, *Anacamptis pyramidalis*, *Geranium tuberosum*, *Neotinea tridentata*, *Ophrys oestrifera* и др.

В видовом составе сообществ настоящих степей (сн) отмечено 10 РВ, в их числе особо ценные компоненты ковыли: *Stipa lessingiana* subsp. *brauneri*, *S. pontica*, *S. syreitschikowii*, *S. tirsia*, *S. ucrainica*, которые нередко являются доминантами или содоминантами в структуре сообществ настоящей степи и выпадают из травостоя в первую очередь при увеличении антропогенной нагрузки.

В составе травостоя петрофитной степи (лп) особенно много (43) РВ. На каменистых участках встречаются *Astragalus arnacantha*, *Bellevalia speciosa*, *Crambe tataria*, *Pisum elatius*, *Phelypaea coccinea*, *Rumia crithmifolia*, *Stipa eriocaulis* subsp. *lithophila* и др. На выходах известняков обычны виды *Stipa pulcherrima* и *S. syreitschikowii*. Примечательны сообщества каменистой степи, где доминируют формации охраняемых таксонов: *Asphodeline lutea* (ПК 5, ПК 6, ПК 10), *Asphodeline taurica* (ПК 1–10), *Hedysarum candidum* (ПК 7), *H. tauricum* (ПК 1–8), *Iris pumila* (ПК 10), *Paeonia tenuifolia* (ПК 1, ПК 2, ПК 4), образуя красочные аспекты в период цветения.

В числе видов, слагающих фриганоидные сообщества (фр), отмечено 29 редких таксонов, включая полукустарнички: *Cerastium biebersteinii*, *Ptilostemon echinocephalus*. Ассоциация *Cotinetum thymosum*, описанная на крутом склоне хр. Агармыш (ПК 5), в составе фриганоидного сообщества на высоте 600 м н. у. м. – единственное место произрастания *Globularia trichosantha* в ЮВК (Каменских, 2011).

Большинство редких видов, характерных для травостоя петрофитных степей, встречаются также и в нагорно-ксерофитных (фриганоидных) сообществах, это *Anthemis sterilis*, *Astragalus reduncus*, *A. suprapilosus*, *Crocus pallasii*, *Genista albida*, *Hedysarum candidum*, *Iris pumila*, *Linum pallasianum*, *Onosma polyphylla*, *Paronychia cephalotes*, *Pulsatilla halleri* subsp. *taurica*, *Salvia scabiosifolia*, *Satureja montana* subsp. *taurica*, *Sideritis syriaca* и др. (табл. 3).

В разнотравно-типчаково-ковыльных и петрофитных ценозах нередко доминантом является *Stipa pontica*; отмечен на каменистых склонах редкий злак *Elytrigia stipifolia* (ПК 1–4, ПК 7, ПК 8), ранней весной местами обильно вегетирует эфемероид *Colchicum ancyrense* (ПК 1–4, ПК 6–8). Как в луговой, так и в петрофитной степи встречаются *Himantoglossum caprinum*, *Pisum sativum* subsp. *elatius*.

В сообществах различных типов степей произрастают *Anacamptis morio* subsp. *caucasica*, *Orchis simia*, *Stipa capillata*, *S. pulcherrima*, *Tulipa sylvestris* subsp. *australis*, *T. suaveolens*.

В травостое разнотравно-злаковых умеренно нарушенных степей (рзн) встречаются 32 редких видов, характерных и для других типов степных ценозов. В Баракольской котловине, в полынно-разнотравном сообществе произрастает редкий таксон *Elytrigia strigosa* (ПК 1, ПК 4, ПК 5). Саванноидно-степные сообщества (сс) обеднены редкими элементами флоры, в их составе отмечены только эфемер *Triticum boeoticum*.

На выходах материнских пород, скалах, каменистых осыпях (со) единично или малочисленными популяциями растет 31 охраняемый вид: *Allium nathaliae* (ПК 1, ПК 6), *Atrapaxis replicata* (ПК 1, ПК 7, ПК 9), *Heracleum ligusticifolium* (ПК 6, ПК 8), *Minuartia adenotricha* (ПК 1, ПК 2, ПК 6–8, ПК 10), *M. euxina* (ПК 1, ПК 6–8), *M. taurica* (ПК 1, ПК 6, ПК 7), *Notholaena marantae* (ПК 1), *Ptilostemon echinocephalus* (ПК 1–4, ПК 6–8) и др. (табл. 3).

В составе сильно разреженной петрофитной и нагорно-ксерофитной растительности, в лиофильных группировках на каменистых склонах (ркс) произрастают 50 редких таксона. На выходах материнских пород, осыпях встречаются *Atrapaxis replicata* (ПК 1–3, ПК 7, ПК 8, ПК 10), *Astragalus reduncus* (ПК 1–4, ПК 8), *Cerastium biebersteinii* (ПК 1, ПК 6, ПК 8), *Convolvulus sericocephalus* (ПК 2–4, ПК 7), *Delphinium fissum* subsp. *pallasii* (ПК 1–6, ПК 8), *Eremurus spectabilis* (ПК 1, ПК 5,

ПК 6, ПК 8, ПК 10), *Euphorbia rigida* (ПК 1–4, ПК 7, ПК 8), *Rhaponticoides taliewii* (ПК 2, ПК 4, ПК 8), *Rumex scutatus* subsp. *hastifolius* (ПК 1, ПК 4) и др. (табл. 3).

На глинистых эрозионных склонах (ргс) среди разреженного травостоя отмечено 29 редких элементов флоры в их числе *Centaurea ovina* (ПК 1–4, ПК 6–8), *Capparis herbacea* (ПК 1–4, ПК 6–9), *Cleome ornithopodioides* subsp. *canescens*, *Conringia clavata* (ПК 1, ПК 2, ПК 4, ПК 7), *Rindera tetraspis* (ПК 2, ПК 4), *Onobrychis pallasii* (ПК 1–8), *Pisum sativum* subsp. *elatius* (ПК 1, ПК 2, ПК 6–8), *Vicia ervilia* (ПК 1–3). На глинистом остепененном склоне хр. Тепе-Оба встречается единственное на территории ПК ЮВК место произрастания *Sternbergia colchiciflora* (ПК 3). Особо специфичен растительный покров с участием *Lepidium turczaninowii* на глинистых меловых обнажениях береговых склонов мыса Святого Ильи (ПК 3) и в районе Армутлукской долины (ПК 9) на склонах безымянных холмов и г. Белой (Ена и др., 2001; Миронова, Фатерыга, 2014).

На приморских глинисто-каменистых склонах, скальных обрывах, осыпях (пгс) единично или в составе небольших группировок произрастает 14 РВ, в их числе *Astrodaucus littoralis* (ПК 1–3, ПК 7, ПК 8), *Euphorbia rigida* (ПК 1–4, ПК 7, ПК 8), *Ferula caspica* (ПК 2–4, ПК 7), *Isatis littoralis* (ПК 1–4, ПК 6–8), *Stipa eriocaulis* subsp. *lithophila* (ПК 1–8) и др. На примоском склоне Енишарских гор (ПК 2) отмечено единственное в ЮВК место произрастания многочисленной популяции *Prangos trifida*. Здесь же, а также на южном эрозионном склоне хр. Узунсырт встречается *Rindera tetraspis* (ПК 2, ПК 4).

В зоне воздействия морского аэрозоля на открытых глинистых, эрозионных солонцеватых приморских склонах (пгс) отмечен 21 редкий таксон. На выходах меловых и мергелистых пород встречаются *Asparagus maritimus* (ПК 3, ПК 7), виды рода *Crambe*: *C. koktebelica* (ПК 1–3, ПК 7, ПК 8), *C. tataria* (ПК 2–4, ПК 7). Зафиксировано одно место произрастания *Avena barbata* (ПК 3). Вдоль морского побережья на выходах глинистых сланцев отмечено присутствие *Verbascum orientale* (ПК 1–4, ПК 6, ПК 7), численность которого заметно снизилась в настоящее время.


Малочисленными популяциями на приморских глинисто-каменистых склонах, глинах, местами превращенных денатурацией в бедленды, встречается полукустарник *Krascheninnikovia ceratoides* (ПК 2–4, ПК 7, ПК 9). На шиферных каменисто-глинистых эродированных приморских склонах от Меганома до Лисьей бухты произрастает *Tulipa biflora* (ПК 7, ПК 8).

У подножья береговых холмов, на щебнисто-глинистой засоленной почве и на тыльной стороне пляжа встречается *Nitraria schoberi* (ПК 2–3, ПК 7, ПК 8), *Euphorbia paralias* (ПК 1–3) и *Verbascum pinnatifidum* (ПК 2, ПК 3, ПК 7).

Вдоль морского побережья, на галечниках и песчаных пляжах (мн) растёт 16 охраняемых видов, в их числе *Argusia sibirica* (ПК 1–3, ПК 8), *Cakile maritima* subsp. *euxina* (ПК 1–3, ПК 7, ПК 8), *Crambe koktebelica*, *C. maritima* L. (ПК 1–3, ПК 7, ПК 8), *C. pinnatifida* (ПК 1, ПК 7), *Crithmum maritimum* L. (ПК 7), *Eryngium maritimum* L. (ПК 1–3, ПК 7, ПК 8), *Glaucium flavum* (ПК 1–3, ПК 7, ПК 8), *Trachomitum venetum* (ПК 2, ПК 3, ПК 7). На побережье и в устьях приморских балок встречаются *Vitex agnus-castus* (ПК 7), *Leymus racemosus* subsp. *sabulosus* (ПК 2, ПК 3, ПК 7, ПК 8). На приморских глинисто-каменистых склонах, осыпях, иногда на галечниках прибрежной полосы, растет малочисленными популяциями *Silene supina* (ПК 1, ПК 2, ПК 7, ПК 8).

Крайне редки на территории ПК экотопы, где существует дополнительное увлажнение (увд), в их пределах отмечены 5 редких охраняемых видов: *Epipactis palustris* (ПК 6), *Lythrum thymifolia* (ПК 1, ПК 4–6), *Gladiolus imbricatum* (ПК 6). Все эти растения в ЮВК относятся к группе особого риска, поскольку в годы с засушливыми гидротермическими условиями или при общем иссушении климата они являются первостепенными кандидатами на выпадение из состава флоры региона.

Необходимо отметить, что значительное число таксонов (43) имеют широкий фитоценотический ареал, приспособленных к обитанию в различных экологических условиях, встречаются одновременно в разных, хотя и схожих, типах трех и более биотопов, следовательно, обладают широкой экологической амплитудой и, как правило, отличаются и высокой природной устойчивостью. Группу риска составляют 48 таксонов, произрастающих в пределах только одного-двух биотопов. Наиболее вероятна гибель и потеря вида во флоре региона в случае приуроченности его к одному редкому биотопу. Особо уязвимы в этой группе 14 таксонов, встречающиеся в пределах прибрежных экотопов, которые занимают незначительные площади, большинство из них в настоящее время деградирует или полностью уничтожается в результате тотальной застройки побережья. Характеристика выделенных биотопов по числу произрастающих в них редких охраняемых видов приводится на рис. 3.



**Рис. 3.** Оценка основных биотопов ПК ЮВК по числу произрастающих в них редких охраняемых видов. Условные обозначения: лт – тенистые высокоствольные леса; лтп – опушки и поляны тенистых высокоствольных лесов; лс – светлые леса; лсп – опушки и поляны светлых среднерослых лесов; кш – заросли листопадных кустарников и шибляковые низкорослые дубово-грабинниковые сообщества; кшп – опушки и поляны шибляковых низкорослых дубово-грабинниковых сообществ; рд – редколесья можжевеловые, фисташковые, дубовые; рдп – опушки и поляны редколесья; сл – луговая степь; сн – настоящая степь; сп – петрофитная степь; рзн – разнотравно-злаковые сообщества; огс – опустыненные степи; сс – саванноидно-степные сообщества; фр – фриганоидные сообщества; со – не сомкнутые петрофитные группировки; ркс – разреженная полукустарничковая внутриконтинентальная растительность на подвижном каменистом субстрате; ргс – разреженная внутриконтинентальная растительность на подвижном глинистом субстрате (включая бедленды); пкс – сильно разреженная растительность приморских глинисто-каменистых склонов; пгс – сильно разреженная степная, галофитная и псаммофитная растительность на каменисто-глинистых склонах (включая бедленды) в зоне воздействия морского аэрозоля; мп – галофитная, псаммофитная, гало-нитрофитная растительность песчаных и галечниковых пляжей морского побережья; увд – растительность берегов водоемов, временных водотоков, мест с дополнительным увлажнением, внутриконтинентальных озёр.

Данные о распространении РВ по биотопам во многом характеризуют оптимальные условия их произрастания и толерантность. Виды, имеющие ограниченный фитоценотический ареал, узкую экологическую амплитуду и произрастающие малочисленными популяциями, особо уязвимы, поскольку при изменении условий произрастания могут исчезнуть из флоры региона.

**Степень изученности охраняемых редких сосудистых растений природных комплексов ЮВК.** Подводя итоги многолетних исследований РВ, следует отметить недостаточную степень изученности раритетной флоры во всех ПК (Миронова, Шатко, 2005; 2011 б; Миронова, Таран, 2011). Выявлены, безусловно, не все места произрастания для большинства таксонов. Для ряда видов в пределах некоторых ПК известен только факт произрастания на основании старых гербарных образцов без точного указания места сбора (*Argusia sibirica*, ПК 1; *Astragalus ponticus*, ПК 1; *Nitraria schoberi*, ПК 1) или литературных источников (*Crambe steveniana*, ПК 1; *Crithmum maritimum*, ПК 1). Существует дефицит данных о численности популяций видов родов *Crambe* (*C. pinnatifida*, *C. steveniana*), *Elytrigia* (*E. stipifolia*, *E. strigosa*) и *Stipa* (*S. pontica*, *S. syreistschikowii*, *S. tirsa*). Весьма противоречивы сведения о состоянии и численности популяций некоторых представителей семейства *Orchidaceae*, поскольку их особи образуют генеративные органы и даже надземные вегетативные побеги далеко не каждый год и в значительной степени зависят как от гидротермических условий года наблюдений, так и от специфики онтогенетического развития. В широком диапазоне по годам колеблется численность однолетних и малолетних растений (*Avena barbata*, *Cakile maritima* subsp. *euxina*, *Cerastium bulgaricum*, *Conringia clavata*, *Lythrum thymifolia*, *Triticum boeoticum*, *Verbascum orientale*, *Vicia ervilia* и др.). Эти виды могут сохраняться в течение многих лет в виде почвенного банка семян, а в благоприятные для их вегетации годы дать массовую вспышку численности.

Значительные номенклатурно-таксономические изменения произошли в понимании принадлежности и объема ряда таксонов рода *Allium* (Серёгин, 2004, 2007), поэтому существует необходимость в проведении ревизии видов этого рода в ЮВК.

В список охраняемых редких видов ПК ЮВК включены таксоны, наличие которых не подтверждалось более 30 лет (табл. 3). Причины могут быть разные. Возможно исчезновение вида в местах их произрастания в связи со сменой эдафических условий (*Blackstonia perfoliata*, ПК 1; *Orchis militaris* subsp. *stevenii*, ПК 1); длительная вегетация без появления надземной части растения (*Epipactis palustris*, ПК 1, ПК 8) и т. д. Необходимо провести целенаправленные поиски мест произрастания не обнаруженных растений для подтверждения или опровержения их наличия во флоре ПК.

Появилась информация об ошибочном определении таких видов как *Arum italicum* subsp. *albispodium*, *Crambe steveniana*, *Verbascum orientale* (<http://www.plantarum.ru/page/view/item/11809.html>). Необходимо уточнить номенклатурно-таксономическую принадлежность ряда видов, возможно, с применением молекулярно-филогенетических методов систематики, основанных на применении ПЦР и новых подходах в оценке родства таксонов.

Количественная и возрастная структура популяций 27 видов (*Coeloglossum viride*, *Convolvulus sericocephalus*, *Euphorbia paralias*, *Minuartia euxina*, *M. taurica*, *Rumex scutatus* subsp. *hastifolius*, *Satureja montana* subsp. *taurica*, *Sedum rubens*, *Verbascum orientale*, *V. pinnatifidum* и др.) нами в естественных условиях произрастания ЮВК не определялась ни на одной исследуемой ПК. Отсутствует информация о популяционных исследованиях этих видов на территории ЮВК и в специальной литературе. К настоящему времени для большинства видов 8-ми ПК установлена только общая ориентировочная численность (табл. 6).

**Таблица 6.**  
**Число растений с установленной общей ориентировочной численностью на территории ПК ЮВК**

Показатели	№ ПК							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Общее число РВ на территории ПК	118	89	90	70	65	86	87	101
Число РВ с оценкой общей численности.	85	59	40	41	30	60	48	63
% РВ с установленной общей численностью	72	66,3	44,4	58,6	46,2	69,8	55,2	62,4

Примечание: Учитывались при расчете виды интродуцированные и натурализовавшиеся на территории: *Cyclamen coum* (ПК 1) и *Pinus brutia* (ПК 1, ПК 8).

В условиях ЮВК для большинства РВ наблюдается дефицит информации о пространственно-возрастной структуре популяций, динамике численности, особенностях биологии, включая длительность прохождения возрастных стадий и фенологию. Достоверные данные по этим параметрам, особенно для диномичных популяций, можно получить в процессе многолетних стационарных наблюдений (мониторинга) в естественных условиях произрастания вида, посещения их в течение нескольких вегетационных периодов, в годы с различными гидротермическими условиями.

Мониторинг численности и возрастной структуры популяций был организован первоначально для 12 РВ на территории ПК 1 (Миронова, Шатко, 2004). В последующие годы стационарные исследования расширились за пределы Карадага, число объектов наблюдения увеличивалось, достигнув в настоящее время 29-ти охраняемых видов флоры Крыма, и проводится ботаниками на территории 9-ти разных ПК (табл. 3, 7).

**Таблица 7.**  
**Объекты многолетних стационарных наблюдений в ПК ЮВК**

№ ПК	Название вида	Число видов
1	<i>Adonis vernalis</i> , <i>Allium siculum</i> subsp. <i>dioscoridis</i> , <i>Asphodeline taurica</i> , <i>Capparis herbacea</i> , <i>Crambe koktebelica</i> , <i>Crataegus orientalis</i> subsp. <i>pojarkoviae</i> , <i>Cyclamen coum</i> *, <i>Galanthus plicatus</i> , <i>Glaucium flavum</i> , <i>Eremurus spectabilis</i> , <i>Himantoglossum caprinum</i> , <i>Limodorum abortivum</i> , <i>Neotinea tridentata</i> , <i>Ophrys oestrifera</i> , <i>Orchis punctulata</i> , <i>O. purpurea</i> , <i>O. simia</i> , <i>Paeonia tenuifolia</i> , <i>Platanthera chlorantha</i> , <i>Tulipa suaveolens</i>	20
2	<i>Prangos trifida</i> , <i>Rindera tetraspis</i> , <i>Tulipa suaveolens</i>	3
3	<i>Capparis herbacea</i> , <i>Lepidium turczaninowii</i> , <i>Ophrys apifera</i> , <i>Op. oestrifera</i> , <i>Orchis punctulata</i> , <i>O. purpurea</i>	6
4	<i>Crataegus orientalis</i> subsp. <i>pojarkoviae</i> , <i>Orchis punctulata</i> , <i>Rindera tetraspis</i>	3
5	<i>Crataegus tournefortii</i>	1
6	<i>Capparis herbacea</i> , <i>Cephalanthera rubra</i> , <i>Eremurus spectabilis</i> , <i>Galanthus plicatus</i> , <i>Himantoglossum caprinum</i> , <i>Juniperus excelsa</i> , <i>Limodorum abortivum</i> , <i>Orchis. purpurea</i> , <i>Tulipa biflora</i>	8
7	<i>Capparis herbacea</i> , <i>Eryngium maritimum</i>	2
8	<i>Anacamptis morio</i> subsp. <i>caucasica</i> , <i>Anacamptis pyramidalis</i> , <i>Capparis herbacea</i> , <i>Glaucium flavum</i> , <i>Neotinea tridentata</i> , <i>Himantoglossum caprinum</i> , <i>Tulipa biflora</i> , <i>T. suaveolens</i>	8
9	<i>Lepidium turczaninowii</i> , <i>Tulipa biflora</i>	2

Примечание: \* вид интродуцирован на территорию ПК

Обобщение и анализ результатов популяционных исследований на территории ПК ЮВК проводились нами в 2004 и 2011 годах (Миронова, Таран, 2011; Миронова Шатко, 2004, 2011). Результаты мониторинга состояния популяций ПК опубликованы в соответствующих научных изданиях и в Летописи природы Карадагского заповедника (табл. 8).

Таблица 8.

**Основные публикации по популяционным исследованиям редких охраняемых видов флоры ПК ЮВК**

№ ПК	Название территории	Источники
1	Карадагский горный массив	Шатко, Миронова, 1986б, 1988, 2000а, б; Миронова, Шатко, 1987, 2004, 2008; Миронова, 2003, 2007а, 2009, 2010б; Кузьманенко, 2006; Миронова, Лапченко, Шатко, 2006; Летухова, 2009; Калистая и др., 2013; Фатерыга, 2016; Фатерыга, 2018
2	Енишарские горы с берегом Тихой бухты	Миронова, 2009; Миронова, Шатко, 2011
3	Хр. Тепе-Оба с мысом Св. Ильи	Ена Ан., Ена Ал., 2001; Миронова, 2007; Летухова, 2017а, б; Летухова, Потапенко, 2017
4	Хр. Узунсырт и Баракольская котловина	Миронова, 2010б
5	Горный массив Агармыш	Летухова, Потапенко, 2015
6	Горный массив района пгт Краснокаменка	Миронова, 2007а, 2009, 2010б; Летухова, Потапенко, 2018
7	П-ов Меганом	Миронова, Шатко, 2010
8	Горный массив Эчки-Даг с берегом Лисьей бухтой	Миронова, Лапченко, Шатко, 2006; Миронова, 2007 а; Фатерыга, 2018
9	Безымянные холмы и г. Белая в Армутлукской долине	Миронова, Фатерыга, 2014
10	Горный массив Френк-Мезер	Отсутствуют

**Редкие сосудистые растения ПК ЮВК, не включённые в ККРК и ККРФ.**

В растительном покрове ПК ЮВК, как и на всей территории Крыма, существуют виды, не имеющие в настоящее время статуса охраны на федеральном (ККРФ) и республиканском (ККРК) уровне, но редко встречающиеся, недостаточно изученные, сравнительно недавно обнаруженные, а также включённые в Международные охранные списки, но не редкие для региона. В этой группе есть виды, у которых наблюдается сокращение границ популяций, снижение численности, поэтому в дальнейшем возможно расширение за счёт этих таксонов списка «краснокнижных» видов ЮВК, а может, и всего крымского полуострова.

Редкие для ЮВК виды, не имеющие зоологического статуса и виды, входящие в международные охранные списки, но не редкие для региона, нами включены в список условно редких, который насчитывает 105 таксонов (табл. 9).

В числе неохранимых растений заслуживает внимание *Petrorrhagia cretica* – вид, не включенный во флору Крыма (Ена, 2012). Единственное место произрастания этого таксона было обнаружено нами 22.06.2001 г. вблизи вершины г. Урманы-Усту на п-ове Меганом (ПК 8) (Миронова, Шатко, 2013). Необходимо изучение популяций *Fumaria parviflora*, вида нового для флоры Крыма, обнаруженного на Карадаге ещё 1980 году, но ранее ошибочно определенного как *F. vaillantii* Loisel. и *F. schleicheri* Soy. – Willem (Фатерыга, Фатерыга, 2019).

Требуется целенаправленное изучение представителей рода *Orobanche* (сем. *Orobanchaceae* Vent.), представленного во флоре исследуемых территорий 10-ю видами. Виды этого рода паразитируют на различных сосудистых растениях и нами они не отнесены к категории редких для региона, но требуют целенаправленного изучения, включая уточнение видовой принадлежности.

Таблица 9.

**Сосудистые растения ПК ЮВК, не включённые в ККРК и ККРФ, но нуждающиеся в охране и контроле над состоянием популяций**

Таксономические группы / основная биоморфа	ЭК*/ Mc**/ редкость вида в Крыму и ЮВК	Номер природного комплекса								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Отдел <i>EQUISETOPHYTA</i> – ХВОЩЕОБРАЗНЫЕ										
Сем. <i>Equisetaceae</i> Michx. ex DC – Хвощевые										
<i>Equisetum arvense</i> L. – Пол.	EKC <sub>2011</sub> / из / др	1	+	+	-	+	+	-	+	
<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf. – Пол.	- / др / дрV	+	1	-	-	+	+	-	+	
<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh. – Пол.	- / из / опV	-	-	-	-	+	+	-	-	
Отдел <i>MAGNOLIOPHYTA (ANGIOSPERMAE)</i> – ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ										
Сем. <i>Amaryllidaceae</i> J. St.-Hil. (включая <i>Alliaceae</i> Batsch ex Borkh.) – Амарилловые										
<i>Allium atroviolaceum</i> Boiss. [ <i>A. firmotunicatum</i> Fomin] – Пол.	EKC <sub>2011</sub> / из / из	+	-	+	+	+	+	+	+	
<i>Allium cyrilli</i> Ten. (Серёгин, 2007) – Пол.	EKC <sub>2011</sub> / из / др	+	-	-	-	-	+	?	?	
<i>Allium moschatum</i> L. – Пол.	EKC <sub>2011</sub> / из / др	+	+	+	-	-	+	+	+	
Сем. <i>Apiaceae</i> Lindl. ( <i>Umbelliferae</i> Juss.) – Зонтичные										
<i>Heracleum sibiricum</i> L. – Мон, Пол.	- / из / оп	0	-	-	-	+	+	-	-	
Сем. <i>Apoocynaceae</i> Juss. (включая <i>Asclepiadaceae</i> R. Br.) – Кутровые										
<i>Vincetoxicum albovianum</i> (Kusn.) Pobed. [ <i>V. stepposum</i> (Pobed.) A. et D. Love] – Пол.	- / pR / opR	-	1	-	-	-	+	1	-	
<i>Vincetoxicum fuscatum</i> (Hornem.) Endl. [ <i>Vincetoxicum minus</i> (K. Koch) K. Koch] – Пол.	- / pR / дрR	1	-	-	-	+	1	-	-	
<i>Vincetoxicum schmalhausenii</i> (Kusn.) Stank. – Пол.	- / из / 1pV	+	-	-	-	-	-	-	-	
Сем. <i>Asteraceae</i> Martinov – Сложноцветные										
<i>Crepis alpina</i> L. – Оз. одн.	- / др / J	+	-	-	-	-	-	+	-	
<i>Crepis zacintha</i> (L.) Loisel. [ <i>Zacintha verrucosa</i> Gaertn.] – Одн.	- / др / оп	Ед	-	-	-	-	+	-	-	
<i>Galatella sedifolia</i> (L.) Greuter subsp. <i>dracunculoides</i> (Lam.) Greuter [ <i>Galatella dracunculoides</i> (Lam.) Nees] – Пол.	- / p / op	+	-	-	-	+	-	+	-	
<i>Lactuca saligna</i> L. – Мон.	/EKC <sub>2011</sub> /p/оп	+	-	-	-	+	-	+	-	
Сем. <i>Asparagaceae</i> Juss. (частично включая <i>Liliaceae</i> Juss.) – Спаржевые										
<i>Ornithogalum arcuatum</i> Steven – Пол.	- / 1опV / 2др	+	-	-	-	-	3	-	-	
<i>Ornithogalum refractum</i> Kit. ex Schldl. – Пол.	- / p / op	-	-	-	-	+	+	-	-	
Сем. <i>Boraginaceae</i> Juss. – Бурачниковые										
<i>Moltzia caerulea</i> (Willd.) Lehm. – Пол	- / 1pV / 1opE	-	-	-	-	-	-	+	-	
<i>Onosma visianii</i> Clementi. – Мон.	- / др / др	1	+	-	-	-	+	+	+	
Сем. <i>Berberidaceae</i> Juss. – Барбарисовые										
<i>Berberis vulgaris</i> L. – К.	- / до / др	1	-	+	-	+	+	-	-	
Сем. <i>Brassicaceae</i> Burnett (Cruciferae Juss.) – Крестоцветные										
<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L. [ <i>Alyssum calycinum</i> L.] – Оз. одн.	EKC/об/ из	+	-	-	-	+	+	+	+	
<i>Matthiola odoratissima</i> (M. Bieb.) W. T. Aiton. – Пкч.	- / pR / pR	+	+	+	+	-	+	+	+	

## Продолжение таблицы 9.

<i>Neotorularia torulosa</i> (Desf.) Hedge et J. Leonard [ <i>Torularia torulosa</i> (Desf.) O.E.Schulz] – Оз. одн.	- / opV / opV	+	+	-	-	-	-	+	-
<i>Conringia austriaca</i> (Jacq.) Sweet. – Оз. Одн. (Фатерыга, 2019)	- / до / др	1	+	+	+	-	+	+	+
<i>Raphanus odessanus</i> (Andrz.) Spreng. [ <i>Raphanus maritimus</i> Smith] – Мон, Пол.	- / др / 1opV	+	-	-	-	-	-	-	-
Сем. <i>Campanulaceae</i> Juss. – Колокольчиковые									
<i>Campanula sibirica</i> L. subsp. <i>taurica</i> (Juz.) An. Fed. [ <i>Campanula taurica</i> Juz.] – Мон.	ЭК / др/до / из	1	1	-	1	3	+	+	+
<i>Campanula rapunculoides</i> L. – Пол	- / opR / 2opR	+	-	-	-	-	+	-	+
Сем. <i>Caprifoliaceae</i> Juss. (включая <i>Dipsacaceae</i> Juss. и <i>Valerianaceae</i> Batsch) – Жимолостные									
<i>Valeriana tuberosa</i> L. – Пол	- / из / 1opV	0	+	+	+	-	-	-	-
Сем. <i>Caryophyllaceae</i> Juss.									
<i>Cerastium pumilum</i> Curtis [ <i>Cerastium crassiusculum</i> Klokov] – Оз. одн.	EKC <sub>1998</sub> / pR / pR	1	-	+	+	-	-	+	+
<i>Petrorhagia cretica</i> (L.) P. W.Ball et Heywood [ <i>Tunica pachygona</i> Fisch. et C. A.Mey.] – Оз.одн.	- / - / 1 op	-	-	-	-	-	-	1	-
<i>Scleranthus perennis</i> L. – Пол.	- / op / 1opR	+	-	-	-	-	-	-	-
<i>Silene viridiflora</i> L – Пол	- / p / pR	-	-	-	-	+	+	-	-
<i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl [ <i>Spergularia maritima</i> (All.) Chiov.] – Пол, Мон.	- / p / opE	Ед.	+	+	-	-	-	-	-
Сем. <i>Chenopodiaceae</i> Vent. – Маревые									
<i>Ofaiston monandrum</i> (Pall.) Moq. – Одн.	- / 1pR / / 1opR	-	+	-	-	-	-	-	-
<i>Helianthemum stevenii</i> Rupr. ex Juz. et Pozdeeva. – Пкч (с)	ЭК /из / из	+	-	-	+	+	+	+	+
Сем. <i>Cornaceae</i> Dumort. – Кизиловые									
Сем. <i>Cyperaceae</i> Juss. – Осоковые									
<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla [ <i>Scirpus maritimus</i> L.] – Пол.	EKC <sub>2011</sub> / до / из	+	+	+	+	-	-	+	+
<i>Cyperus fuscus</i> L. – Оз. одн..	EKC <sub>2011</sub> / из /др	+	-	-	-	-	-	-	-
<i>Cyperus glaber</i> L. – Оз. одн.	EKC <sub>2011</sub> / др /дрR	+	-	-	-	-	-	-	+
<i>Cyperus longus</i> L.– Пол. .	EKC <sub>2011</sub> / из / др	+	-	-	-	-	-	-	-
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. et Schult. – Пол.	EKC <sub>2011</sub> /из /др	+	-	+	+	+	+	+	+
<i>Scirpus sylvaticus</i> L. – Пол.	- / дрR / дрR	-	-	+	+	-	-	-	+
Сем. <i>Dioscoreaceae</i> R. Br. – Диоскорейные									
<i>Tamus communis</i> L. – Пол (л).	- / из / др	+	-	-	-	+	-	-	+
Сем. <i>Fabaceae</i> Lindl. ( <i>Papilionaceae</i> , включая <i>Caesalpiniaceae</i> ) – Бобовые									
<i>Galega officinalis</i> L. – Пол	- / из / др	-	-	-	-	+	-	-	-
<i>Genista juzepczukii</i> Tzvelev [ <i>Genista pilosa</i> L.] – Кч (с).	- / pR-дрR / др	+	-	+	+	-	-	+	-
<i>Lotus maritimus</i> L. [ <i>Tetragonolobus maritimus</i> (L.) Roth.] – Пол.	ККЧМ /из / pR	+	-	+	+	-	-	-	-

Продолжение таблицы 9.

<i>Medicago fischeriana</i> (Ser.) Trautv. [Trigonella fischerana Ser.] – Оз. одн.	EKC <sub>2011</sub> /1доR/1др	+	-	-	-	-	-	-	-
<i>Medicago medicaginoides</i> (Retz.) E. Small [Trigonella striata L. f.] – Оз. одн.	EKC <sub>2011</sub> / из / др	+	-	-	-	-	-	-	+
<i>Medicago meyeri</i> Grun. – Оз. одн.	- / опR / др	-	+	-	-	-	-	-	-
<i>Onobrychis jailae</i> Czernova. – Пол.	ЭК / до / др	-	-	-	-	+	-	-	-
<i>Onobrychis transcaucasica</i> Grossh. – Пол.	EKC <sub>2011</sub> / из / др	+	-	-	-	-	-	-	-
<i>Trifolium pratense</i> L. – Пол.	EKC <sub>2011</sub> / об / др	Ед.-1	-	-	-	+	-	-	-
<i>Trifolium repens</i> L. – Пол (у)	EKC <sub>2011</sub> / об / из	+	+	+	-	+	-	+	-
<i>Trigonella coerulescens</i> (M. Bieb.) Halacsy – Оз. одн.	- / pR / опR	1	-	-	-	-	-	-	-
<i>Vicia narbonensis</i> L. – Оз. одн.	EKC <sub>2011</sub> / из / опR	Ед	-	-	-	-	+	-	-
Сем. Gentianaceae Juss. – Горечавковые									
<i>Centaurium pulchellum</i> subsp. <i>meyeri</i> (Bunge) Tzvelev – Оз. Одн. (Shiyan, 2014)	- / из / опV	+	-	-	-	+	-	-	+
<i>Centaurium spicatum</i> (L.) Fritsch. – Яр. одн.	- / др / опR	+	-	+	-	-	-	+	+
Сем. Hypericaceae Juss. (Guttiferae Juss.) – Зверобойные									
<i>Hypericum lydium</i> Boiss. (замена <i>Hypericum elongatum</i> Rchb [ <i>Hypericum hyssopifolium</i> Chaix.]) - Пкч.	- / р / др	+	+	1	-	-	+	+	+
Сем. Juncaceae Juss. – Ситниковые									
<i>Juncus articulatus</i> L. – Пол.	EKC <sub>2011</sub> /1опR / опV	1	+	1	-	-	+	+	+
<i>Juncus bufonius</i> L. – Оз. одн.	EKC <sub>2011</sub> / др / опV	+	-	-	-	-	-	-	+
<i>Juncus maritimus</i> Lam. – Пол.	- / до / рЕ	+	-	1	-	-	-	+	-
<i>Juncus ranarius</i> Songeon et E. P. Perrier – Одн.	- / рR / 1опE	+	-	-	-	-	-	-	-
<i>Luzula forsteri</i> (Smith) DC. – Пол.	- / об / др	-	-	+	+	+	-	-	-
Сем. Lamiaceae Martinov (Labiateae Juss.) – Губоцветные									
<i>Mentha arvensis</i> L. – Пол.	- / опR / опR	-	+	-	-	-	-	-	-
<i>Mentha pulegium</i> L. – Пол.	EKC <sub>2011</sub> / из / 2др	Ед.-1	-	+	+	-	-	-	-
<i>Scutellaria albida</i> subsp. <i>colchica</i> (Rech. F.) J.R. Edm. – Пол.	- / из / оп V	-	-	-	-	-	+	-	-
<i>Scutellaria altissima</i> L. – Пол.	- / др / др	1	+	-	-	-	+	-	+
<i>Stachys palustris</i> L. – Пол.	- / рR / 2рR	Ед	-	-	-	-	-	-	+
<i>Teucrium montanum</i> L. subsp. <i>montanum</i> [ <i>Teucrium jailae</i> Juz.] – Пкч (с).	- / до / до	1		-	-		+	-	+
<i>Teucrium scordium</i> L. subsp. <i>scordioides</i> (Schreb.) Arcang. [ <i>Teucrium scordioides</i> Schreb.] – Пол.	EKC <sub>2011</sub> / из / др	1	-	-	-	-	-	-	-
<i>Thymus kosteleckyanus</i> Opiz [ <i>Thymus dzevanovskyi</i> Klokov et Des.-Shost.] – Пкч (у).	EKC <sub>1998</sub> / до / из	+	-	-	-	+	-	+	+

Продолжение таблицы 9.

Сем. Liliaceae Juss. – Лилейные										
<i>Gagea bohemica</i> (Zauschn.) Schult. et Schult. f. [ <i>Gagea callieri</i> Pasch.] – Пол (в).	EKC <sub>1998</sub> / из /из	+	2	2	2	-	4	4	3	
Сем. Lythraceae J. St.-Hil. – Дербенниковые										
<i>Lythrum hyssopifolia</i> L. – Оз. одн.	EKC <sub>2011</sub> / pR / дрR	+	-	-	+	1	1	+	-	
<i>Lythrum salicaria</i> L. – Пол.	EKC <sub>2011</sub> / об/ дрR	+	-	+	+	+	+	+	+	
<i>Lythrum tribracteatum</i> Salzm. ex Spreng. – Яр. одн.	EKC <sub>2011</sub> / pR/ дрR	1	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Lythrum virgatum</i> L. – Пол.	EKC <sub>2011</sub> / pR/ др	+	-	-	+	-	1	-	+	
Сем. Onagraceae Juss. – Кипрейные										
<i>Epilobium lanceolatum</i> Sebast. & Mauri – Пол. (Курченко Е.И. 1957 г., MW0619975)	- / 2pR/2op	+	-	-	-		+	-	-	
<i>Epilobium montanum</i> L. – Пол.	- / до / 1pR	-	-	-	-	1	-	-	-	
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb. – Пол. (Свирина С.А. 2012 г., РНЕО010000)	- / др / 2op	+	-	-	-	-	+	-	-	
<i>Epilobium tetragonum</i> L. – Пол.	- / из / др	+	-	+	-	-	+	-	-	
Сем. Papaveraceae Juss. (включая Fumariaceae Marquis и Hypresoaceae Willk. et Lange) – Маковые										
<i>Fumaria parviflora</i> Lam. – Одн. (новый для Крыма вид) (Фатерыга, Фатерыга, 2019)	- / j / др.	+	-	-	-	-	+	-	+	
Сем. Poaceae (R. Br.) Barnh. – Злаковые										
<i>Crypsis alopecuroides</i> (Pill. et Mitt.) Schrad. – Оз одн.	- / 1opV / 1opV	-	-	-	-	-	-	+	-	
<i>Crypsis schoenoides</i> (L.) Lam. – Яр. одн.	- / из / opV	1	-	-	-	-	-	+	-	
Сем. Polygonaceae Juss. – Гречишные										
<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delabre [ <i>Polygonum lapathifolium</i> L.] – Яр. одн.	EKC <sub>2011</sub> / из / из	+	-	+	+	-	+	-	-	
<i>Polygonum robetii</i> Loisel. (= <i>P. euseinum</i> Chrtek.) – Пол. (Майоров, 1999)	- / 1pR / opR	+	+	-	-	-	-	-	-	+
<i>Polygonum maritimum</i> L. – Пкч	- / 1pR / дрR	1	-	+	-	-	-	-	-	+
Сем. Potamogetonaceae Bercht. et J. Presl – Рдестовые										
<i>Potamogeton lucens</i> L. – Пол.	EKC <sub>2011</sub> / 1p / opE	+	-	-	-	-	-	-	-	+
Сем. Plumbaginaceae Juss. (включая Limoniaceae Ser.) – Свинчатковые										
<i>Goniolimon tataricum</i> (L.) Boiss. [ <i>olimon tauricum</i> Klokov] – Пол.	- / до /др	Ед	+	+	-	-	+	+	+	
<i>Limonium scorpiarium</i> (Pall. ex Willd.) Stank. [= <i>L. meyeri</i> (Boiss.) Kuntze] – Пол (ш). (Фатерыга, 2019).	- / до/ др	1	+	+	+	-	-	+	+	
Сем. Ranunculaceae Juss. – Лютиковые										
<i>Garidella nigellastrum</i> L. – Оз. одн.	- / др / 1op	1	-	-	-	-	-	+	-	
<i>Ranunculus oreophilus</i> M. Bieb. – Пол.	- / из /дрV	Ед	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Ranunculus neapolitanus</i> Ten. – Пол.	- / др / opV	-	+	-	-	-	-	-	-	

Продолжение таблицы 9.

Сем. Rosaceae Juss. – Розоцветные										
<i>Cotoneaster melanocarpus</i> (Bunger) London. – К.	- / из / др	-	-	-	-	+	-	-	-	-
<i>Cotoneaster tauricus</i> Pojark. – К.	ЕКС <sub>1998</sub> / до/ до	5	+	3	+	+	+	+	+	+
<i>Potentilla pindicola</i> Hausskn. Ex Zimm. – Пол. (Шведчикова Н.К., 1990; MW0613387-MW0613389; Кечайкин и др., 2018)	-/1опV /оп	+	-	-	-	-	-	-	-	+
<i>Potentilla thuringiaca</i> Bernh. [ <i>Potentilla chrysantha</i> Trev.] – Пол.	- / 1пR /пR	1	+	-	-	3	1	1	1	+
<i>Prunus tenella</i> Batsch [ <i>Amygdalus nana</i> L.] – К, Кч.	ЕКС <sub>2011</sub> / из / др	+	+	+	+	+	+	-	-	-
<i>Rosa tomentosa</i> Smith [ <i>Rosa</i> <i>tesquicola</i> Dubovik.] – К (л.).	- / др /др	-	-	+	+	+	-	-	-	-
<i>Spiraea hypericifolia</i> Lam. – К.	- / из / 2др	1	-	-	-	5	-	-	-	+
Сем. Sapindaceae Juss. (включая Aceraceae) – Сапиновые										
<i>Acer hyrcanum</i> Fisch. et Mey. subsp. <i>stevenii</i> (Pojark.) E. Murr. [ <i>Acer stevenii</i> Pojark.] – Д.	ЭК/ЕКС <sub>1998</sub> . / из /др	1	-	-	-	+	1	-	-	+
Сем. Scrophulariaceae Juss. – Норичниковые										
<i>Lathraea squamaria</i> L. – Пол.	- / из / пR	-	-	-	-	+	+	-	-	-
<i>Scrophularia rupestris</i> Willd. [ <i>Scrophularia goldeana</i> Juz.] – Пол.	- / из / др	+	-	-	-	+	+	+	+	+
<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort. – Пол.	- / из / 2др	-	-	-	-	+	+	-	-	-
Сем. Solanaceae Juss. – Пасленовые										
<i>Solanum alatum</i> Moench [ <i>Solanum zelenetzkii</i> Pojark.] – Оз. Одн.	ЕКС <sub>1998</sub> /р опV	Ед.	+	+	-	+	-	+	Ед.	
Сем. Tamaricaceae Bercht. et J. Presl – Гребенщиковые										
<i>Tamarix hohenackeri</i> Bunge [ <i>Tamarix smyrnensis</i> Bunge] – К.	- / из / дрV	+	+	-	-	-	-	+	-	-
<i>Tamarix ramosissima</i> Ledeb. – К.	- / из / дрV	+	+	+	+	-	-	+	-	-
<i>Tamarix tetrandra</i> Pall. ex M. Bieb. – К.	- / из / дрV	+	-	+	+	+	-	-	-	+

Примечание: Гл. 1 – данные по жизненной форме вида и их условные обозначения заимствованы из «Биологической флоры Крыма» (Голубев, 1996), расшифровка сокращений указана в примечание к табл. 3; для ряда видов приводятся литературные источники, в которых обосновано изменение в их номенклатуре; Гл. 2 – созологический статус видов имеет буквенные обозначения: ЭК\* – эндем Крыма; Mc\*\* – международные списки: ЕКС<sub>1998</sub> – Европейский красный список 1998 г.; ЕКС<sub>2011</sub> – Европейский красный список 2011 г.; ЕКС – Европейские красные списки 1998 и 2011 гг., ККЧМ – Красная книга Чёрного моря, – – созологический статус отсутствует ; при обосновании редкости видов, использовалась шкала и условные обозначения редкости из «Биологической флоры Крыма» (Голубев, 1996): 1 – вид известен из одного местонахождения; 2 – вид известен из 2–5 местонахождений; 3 – вид известен из 6–10 местонахождений; к – критический; и – исчезающий; оп – очень редкий; 0 – по-видимому, исчезнувший; р – редкий; д – довольно редкий; из – встречается изредка рассеянно; до – довольно обильный; об – обильный; с – сокращающийся; Е – вид под угрозой, количество особей сократилось до критического уровня его исчезновением; V – уязвимый, вид в недалеком будущем может перейти в категорию «под угрозой», большая часть или все популяции его уменьшают численность в связи с переэксплуатацией угодий, интенсивным разрушением мест произрастания или другими изменениями в среде; также вид, численность популяции которого угрожающе снизилась и конечная безопасность которого не гарантирована; вид, представленный ещё обильно, но находится под угрозой в связи с действием неблагоприятных факторов на всем ареале; R – редкий, представленный малочисленными популяциями, которые теперь ещё не оцениваются как Е и V, но находящиеся под угрозой, а также вид узколокализованный, с ограниченным ареалом, биотопами (местами поселения), или вид с

немногочисленными популяциями, разбросанными по большой территории; J – неопределённый; Гл. 3–10 в верхней строке таблицы указаны номера ПК используемые в табл. 3; Гл. 3–10 в нижней строке приводятся данные о виде: + присутствие, - – отсутствие вида, условные обозначения известной общей ориентировочной численности заимствованы из табл. 3.

В настоящее время представляется сомнительным присутствие во флоре Карадагского заповедника *Pedicularis sibthorpii* Boiss. (сем. *Orobanchaceae*), поскольку в месте его первичного обнаружения изменились гидрологические условия и вид там не наблюдается уже более 20 лет.

Отсутствуют данные о численности *Oberna crispata* (Steven) Ikonn. [*Oberna cserei* (Baumg.) Ikonn.] (сем. *Caryophyllaceae*), только на основании литературного источника указано произрастание в ЮБК вида *Oberna commutata* (Guss.) Ikonn для (ПК 1) (Екофлора України, 2002).

Среди видов не охраняемых, но редких для ЮБК в Европейском красном списке 1998 года (ЕКС<sub>1998</sub>) значатся 6 видов: *Acer hyrcanum* subsp. *Stevenii*, *Cerastium pumilum*, *Cotoneaster tauricus*, *Gagea bohemica*, *Thymus kosteleckyanus*, *Solanum alatum* (табл. 9). Относительно редких 27 таксонов для флоры ПК ЮБК, включены в ЕКС 2011 года (ЕКС<sub>2011</sub>): *Equisetum arvense*, *Allium atroviolaceum*, *Al. cyrillii*, *Medicago arabica*, *M. monspeliacia* и др. В Европейских списках 1998 и 2011 гг. присутствует 2 вида включенных в список перспективных для охраны видов. Три вида (*Campanula sibirica*, *Helianthemum stevenii*, *Onobrychis jailae*) – эндемики Крыма (ЭК). Вид *Onobrychis jailae* включен в Красную книгу Черного моря. Состояние и численность популяций этих видов изучены весьма слабо в регионе, требуется проведение дополнительных исследований и, возможно, охраны некоторых из них, хотя бы на региональном уровне.

В числе не имеющих статуса охраны ККРФ и ККРК, но включенных в Международные охранные списки растений, есть виды сорные, заносные для флоры Крыма, поэтому не подлежащие охране в регионе.

Список редких растений ПК ЮБК в перспективе будет расширяться в результате целенаправленного углубленного изучения естественного растительного покрова и состояния малоизученных популяций. Возможно появление новых находок при исследовании труднодоступных участков – отвесных скал, глинистых береговых обрывов, подвижных осипей, круtyх и глубоких ущелий, мест, удалённых от населенных пунктов и дорог. За последнее десятилетие ряд видов уже пополнили список редких видов и получили статус охраны (табл. 3).

**Некоторые пути сохранения редких видов и всего фиторазнообразия ЮБК.** Охрана редких видов может осуществляться на глобальном, межгосударственном, государственном (национальном), республиканском (региональном) и локальном уровнях. Наиболее эффективный и в настоящее время научно обоснованный путь сохранения растений в природной среде, вместе с экотопом в системе особо охраняемых природных территорий (Брижатая и др., 2010). Уничтожение или деградация мест произрастания видов обуславливают потерю или резкое ухудшение видов, произрастающих в их приделах.

Наблюдается постоянное увеличение числа видов, становящихся редкими из-за усиливающегося антропогенного пресса на природные ландшафты ЮБК. Частичное или полное уничтожение сохранившихся фрагментов естественного растительного покрова, особо интенсивно происходит на участках, расположенных на эксплуатируемых землях. На неохраняемых землях территорий ПК в последние годы отмечается возрастание рекреационной нагрузки (ПК 2–4, 7, 8), уничтожение лесных сообществ в результате пожаров (ПК 2) и браконьерских рубок, особенно можжевельников *Juniperus deltoides* и *J. excelsa* (ПК 5, 6). Негативное воздействие на растительный покров местами оказывает перевыпас скота (ПК 6, 7), трофическая и

роющая деятельность кабана (ПК 1, 5) (Миронова, 2016; Миронова, Курочкина, 2001, 2003), косули, оленя (ПК 5).

Катастрофически разрушительное воздействие на прибрежные битопы – места обитания 38 видов редких охраняемых растений оказывает тотальная застройка черноморского побережья. Полное или частичное уничтожение грозит разнотравно-злаково-ковыльным степям в связи с распашкой, строительством и нерегламентированным выпасом скота. Деградация естественного растительного покрова вызывает резкое ухудшение состояния и сокращение численности в его структуре популяций редких растений, что в дальнейшем может привести к уничтожению экотопов, а, следовательно, частичному или полному исчезновению популяций РВ в них произрастающих.

Для поддержания видового разнообразия, сохранения мест произрастания редких и ценных видов растений (уже известных и, возможно, ещё не обнаруженных) и фитоценозов с их участием, важнейшая роль отводится системе особо охраняемых природных территорий (ООПТ) разного ранга (федерального, регионального) (Миронова, 2011, 2013, 2017а; Миронова, Епишин и др. 2013). К ООПТ федерального уровня ЮВК относится Карадагский государственный природный заповедник «ФГБУН КНС – ПЗ РАН», регионального уровня: – 2 ландшафтно-рекреационных парка, 2 – природных парка и 2 – памятника природы (табл. 10).

**Таблица 10.**  
**Площадь общей и охраняемой территории природных комплексов Юго-Восточного Крыма**

№ ПК	Статус охраны в настоящее время	Площадь ПК, км <sup>2</sup>	
		общая	охраняемая
1	Карадагский природный заповедник	21	21
2	Ландшафтно-рекреационный парк «Тихая бухта»	16	15
3	Природный парк «Горный массив Тепе-Оба»	29	12
4	Природный парк «Воздухоплавательный комплекс «Узун-Сырт, г. Климентьевка»	18	4,8 (0,34)
5	Комплексный памятник природы «Агармышский лес»	38	4
6	Охранного статуса нет	28	0
7	Комплексный памятник природы «Полуостров Меганом»	27	6,52 (8,51)
8	Ландшафтно-рекреационный парк «Лисья бухта – Эчкидаг»	23	15,6
9	Охранного статуса нет	2	0
10	Охранного статуса нет	25	0

Примечание: Гл 4. В скобках указана площадь охранной зоны.

Общая площадь всех исследованных нами ПК около 227 км<sup>2</sup>, но только 78,9 км<sup>2</sup> (34,8%) её на данный момент имеют статус ООПТ. Следовательно, большая часть территории ПК не охраняется.

Ключевое положение во всей системе охраны природы, безусловно, занимают государственные заповедники, они являются хранилищем генетического фонда растительного и животного мира, источником информации о природных процессах, но и в заповедниках имеются проблемы, которые препятствуют полноценной охране их территорий, а, следовательно, сохранению фиторазнообразия.

Наблюдаются нарушения природопользования и на ООПТ, особенно регионального значения (Кобечинская, и др. 2005; Миронова, Нухимовская, 2001; Миронова 2007 б, 2013, 2017 б).

Так, в Карадагском заповеднике лишь на 37,7% общей протяженности границы суши растительный покров непосредственно связан с наземными природными и полуприродными сообществами, а почти 60% выступают как фактор его

«островизации». Однако, и сохранившиеся степные участки по холмам вдоль границы – это узкие островки шириной в среднем около 100 м, максимум 500–600 м, за ними следуют рекреационные зоны поселков, автомобильные дороги, сельхозугодья. Роль экологического буфера в этой ситуации вынужденно выполняет прилегающая к границе полоса территории самого заповедника шириной от 100 до 500–600 м, максимум 1000 м в зависимости от рельефа, испытывая антропогенные преобразования в первую очередь и фактически уменьшая естественную заповедную площадь (Миронова, Нухимовская, 2001). Подготовленный научно обоснованный проект охранной зоны и Положение о ней в Крадагском заповеднике до сих пор не утверждены, а земли по периметру заповедника интенсивно застраиваются

Негативное воздействие на почвенно-растительный покров в заповеднике, включая популяции редких видов, оказывает жизнедеятельность кабана (*Sus scrota* L.). Возрастающее антропогенное воздействие на сопредельные с заповедником территории, превращают его в «губку», впитывающую животных с неохраняемых территорий. Численность кабана на Карадаге после введения заповедного режима превышает в отдельные годы все допустимые нормы. Влияние жизнедеятельности кабана на почвенно-растительный покров многообразно, неоднозначно и при высокой его плотности становится мощным отрицательным фактором воздействия на популяции большинства редких травянистых растений.

Изучение растительного покрова на пороях и участках, не поврежденных кабаном, а также анализ содержимого желудков при отстреле животных показали, что около 150 видов растений в той или иной степени употребляются кабаном в пищу (Миронова, 2016а).

При низком урожае плодов основных кормовых пород (*Quercus pubescens*, *Pistacia mutica*, *Pyrus elaeagnifolia* и др.), который может наблюдаться в течение многих (3–10) лет, большую часть рациона составляют подземные органы (луковицы, клубни, корневища) травянистых видов, среди которых 16 редких, внесенных в Красную книгу Республики Крым (2015).

В степных, лесостепных и нагорно-ксерофитных сообществах воздействие кабана испытывают в разной степени популяции *Adonis vernalis*, *Colchicum ancyrense*, *Crocus angustifolius*, *C. pallasii*, *Eremurus spectabilis*, *Paeonia tenuifolia*, *Tulipa suaveolens*.

В лесных биотопах мощному воздействию кабана подвергаются популяции *Crocus speciosus*, *Galanthus plicatus*, *Scilla bifolia* в процессе поедания или повреждения им их корневых систем.

В пределах ценопопуляции *Galanthus plicatus* на участках интенсивных пороев кабана вегетативное размножение преобладает над генеративным, образуются клоны, содержащие до 23 особей. Численность растений на них временами снижается, но впоследствии восстанавливается за счет появления обильных всходов (до 300 экз. на 1 м<sup>2</sup>) и даже превосходит таковую на местах, не повреждаемых кабаном. На пороях кабана в популяции *Allium siculum* subsp. *dioscoridis* отмечается изменение демографической структуры, хотя луковицы кабаном не употребляются в пищу, и общая численность вида пока стабильна (Миронова, Шатко, 2004).

Негативное воздействие оказывает роющая и трофическая деятельность кабана на виды из сем. *Orchidaceae*, поскольку при пороях нарушается или частично уничтожается корневая система растений, у некоторых видов орхидей поедаются корnekлубни. Так, численность популяции *Ophrys oestrifera* после повреждения ее кабаном в 2005 г. упала с 43 до 11 генеративных особей, а в 2007 г. вид на этом участке исчез и не отмечается его произрастание до настоящего времени (2018 г.).

Несмотря на некоторые проблемы, существующие на заповедных территориях, создание новых ООПТ или расширение уже существующих нередко является единственной мерой устранения влияния негативных факторов на растительный

покров. Поэтому площадь ООПТ объектов должна возрастать за счет исключения из перспективных планов хозяйственного использования как типичных (эталонных) не нарушенных, так и уникальных природных территорий, и придания им различных статусов охраны (Миронова, 2007, 2013, 2016 б, 2017 б). Крайне важно еще и законодательно регламентировать хозяйственную деятельность на используемых территориях, в особенности в зонах, прилегающих к границам ООПТ.

В ЮВК особенно актуально и перспективно заповедывание территории ПК 6 в районе пгт Краснокаменка, где естественный растительный покров богат редкими и ценными элементами флоры. Наиболее примечательны здесь девственные уникальные реликтовые можжевеловые леса и редколесья (Миронова, Шатко, 2007; Шатко, Миронова, 2008).

Создание ботанического заказника целесообразно в районе Армутлурской долины, включая г. Белую и безымянные холмы, (ПК 9), где на фрагментах выхода на дневную поверхность пород нижнего мела, произрастают ценопопуляции уникального реликта третичного периода – *Lepidium turczaninowii* (Миронова, Фатерыга, 2014). Охрана этой территории особо важна, поскольку ранее наблюдавшаяся популяция *L. turczaninowii* на мысе Святого Ильи (ПК 3) (Ена, 2001) практически уничтожена при подготовке береговых склонов под планируемую, но пока не реализованную застройку. В пределах данной ПК произрастают также многочисленные полноценные популяции таких редких видов как *Atrapaxis replicata*, *Onobrychis pallasii*, *Phelyraea coccinea*, *Tulipa biflora*, изредка встречается *Linum pallasianum*.

Заслуживает особого внимания для заповедывания район горного массива Френк-Мезер (ПК 10), расположенный вдалеке от поселений. Здесь растительный покров сохранился в естественном состоянии и может рассматриваться в качестве эталона коренных сообществ этого региона. Слоны гор северных и северо-восточных экспозиций, балки, долины и ущелья покрыты лесной растительностью, встречаются фрагменты высокоствольных буковых и грабовых лесов. Поляны на платообразной вершине и склонах горы Френк-Мезер занимают разные типы фитоценозов: лугово-степные, степные и нагорно-ксерофитные. Особо примечательны сообщества с доминированием редких охраняемых видов *Asphodeline lutea*, *Iris pumila*. По предварительным данным, флора ПК 10 района насчитывает более 900 видов сосудистых растений. В ее составе присутствуют почти все представители семейства орхидных, произрастающие в ЮВК. Встречаются нормальные полноценные ценопопуляции *Eremurus spectabilis*. По данным В.Г. Шатко на этой территории обнаружено 3 популяции *Allium siculum* subsp. *dioscoridis* (Шатко, 2014) – вида, который в Юго-восточной части Крыма отмечается только на Карадаге (ПК 1), но нами пока эти данные не подтверждены. Здесь имеются кустарниковые заросли *Spiraea hypericifolia* – вида, редкого для ЮВК, произрастающего кроме г. Френк-Мезер только на хр. Агармыш (ПК 5) и единично на вершине г. Легенер (ПК 1) (Кукушкин, Василенко, 2010; Миронова, Фатерыга, 2015).

Учитывая изложенные выше данные, считаем целесобойным три природных комплекса (ПК 6, ПК 9, ПК 10) рассматривать как особо приоритетные для включения их в особо охраняемые территории в ближайшее время.

Для сохранения фиторазнообразия в ЮВК, помимо создания предлагаемых ООПТ необходимо выявить другие участки с сохранившимся естественным растительным покровом, с редкими элементами флоры, запретить их уничтожение ограничить или регламентировать негативное на них воздействие, даже если эти земли располагаются в пределах населенных пунктов.

В настоящее время почти все наиболее привлекательные и ценные земельные участки вдоль побережья моря и вглубь полуострова на 2–10 км в зависимости от рельефа, распроданы, планируется тотальная их застройка, что снизит рекреационную

и туристическую ценность региона. Для предотвращения негативных воздействий на природу ЮВК необходимо пересмотреть ранее принятые решения о хозяйственном освоении земель и в будущем давать разрешение только на основании полноценных экологических экспертиз, где учтены места произрастания редких видов.

Согласно существующим историческим данным, в течение тысячелетий на полуострове не было социально-экономических условий, которые привели бы к коренным преобразованиям дикой природы, но в два последних столетия этот процесс зародившись, нарастил и в наши дни приобрел катастрофические масштабы. Растительный покров – важнейший компонент любого природного комплекса, на большей части территории Юго-Восточного Крыма в различной степени нарушен и преобразован. Некоторые типы естественной растительности чрезвычайно чувствительны к антропогенным нагрузкам, обладают низкой способностью к восстановлению, поэтому для сохранения фиторазнообразия, включая редкие виды, первостепенно сохранение мест естественного произрастания растений, а также разработка оптимальных индивидуальных методов охраны для конкретных РВ ЮВК.

## Выводы

Разнообразие физико-географических условий, сложная ландшафтная структура природных комплексов Юго-Восточного Крыма создают широкий спектр битопов, порождает высокую дифференциацию и богатство растительного покрова.

Флора сосудистых растений исследована на территории 10-ти ключевых ПК ЮВК общей площадью около 227 км<sup>2</sup>. Площадь отдельных ПК колеблется от 2 (ПК 9), 16 (ПК 2) до 38 (ПК 5) км<sup>2</sup>. Опубликованы конспекты флор сосудистых растений 8-ми ПК, составленные на основании собственных (ПК 1, ПК 3, ПК 4, ПК 6–8) и частично литературных (ПК 2, ПК 5) данных. Установлено, что общее число видов сосудистых растений, произрастающих в 8-ми ПК, варьирует от 671 (ПК 2) до 1183 (ПК 1).

На территории 8-ми ПК произрастает 156 таксона сосудистых растений, включенных в Красные книги РФ (2008) и РК (2015), относящихся к 44 семействам и 104 родам. Более половины охраняемых видов (90, или 58,4% от общего числа таксонов, имеющих созологический статус) относятся к 8 семействам, в их числе: *Orchidaceae* (27 видов), *Brassicaceae* (13), *Poaceae* (13), *Fabaceae* (12), *Apiaceae* (7), *Caryophyllaceae* (7), *Rosaceae* (6), *Asparagaceae* (6). Среди РВ 69 имеют охранные статусы и другого уровня: в Европейском Красном списке животных и растений – 52; в списке Конвенции по международной торговле видами дикой флоры и фауны – 29; в списке Бернской конвенции – 9, в исправленном дополнении к Бернской конвенции – 1; в Красной книге Черного моря – 6 видов.

Во флоре Крыма 106 видов и подвидов эндемиков (Ена, 2001, 2002), в числе которых менее половины (40, или около 38%) имеют охранный статус ККРФ и ККРК, из них 20 вид (19% от всех эндемиков Крыма и 50% от охраняемых) произрастают на территории исследованных ПК ЮВК. Число охраняемых эндемичных растений в отдельных ПК колеблется от 10 (ПК 4, ПК 5) до 17 (ПК 1).

Виды, имеющие федеральный и республиканский статус охраны, – преимущественно многолетние растения, в их числе деревья – 4, кустарники – 2, виды, произрастающие в форме, как дерева, так и кустарника, – 7, полукустарники – 1, кустарнички – 2, полукустарнички – 15, поликарпические травы – 104. Два вида могут иметь форму, как поликарпической травы, так и монокарпической (*Allium siculum* subsp. *dioscoridis*, *Glaucium flavum*). Малолетних и однолетних трав в списке РВ всего 18 (среди охраняемых видов 12,3%): 3 монокарпика, 14 однолетников озимых и яровых, 1 монокарпик или однолетник.

На территориях ПК ЮВК число охраняемых РВ из Красной книги Российской Федерации (2008) варьирует от 26 (ПК 4) до 41 (ПК 1); число таксонов, включенных в ККРК (2015), колеблется в пределах от 64 (ПК 5) до 100 (ПК 8) и 119 (ПК 1). Самое высокое видовое разнообразие и число видов на 1 км<sup>2</sup> наблюдается на территории Карадагского заповедника, хр. Тепе-Оба и горного массива Эчкидаг (ПК 1, ПК 3, ПК 8). Наибольшее значение индекса редкости зарегистрировано на Карадаге, Енишарах и Эчкидаге (ПК 1, ПК 2, ПК 8). Эти показатели связаны как со спецификой природных условий, разнообразием биотопов, размером ПК, так и степенью изученности этих территорий. Характерно снижение числа редких видов на 1 км<sup>2</sup> и индекса редкости при увеличении площади ПК, поэтому наименьшего значения достигают эти параметры на территории хр. Агармыш (ПК 5).

В пределах, исследуемых 8-ми ПК, условно выделено 22 биотопа. Пространственное распространение, число и численность популяций РВ в значительной степени определяет число и площадь биотопов, в пределах которых вид произрастает. РВ имеющие низкую толерантность, узкую экологическую амплитуду, приуроченные к биотопам, редко встречающимся на территории и ПК и занимающим небольшие площади, подвергаются наибольшей опасности сокращению численности или полному исчезновению.

Список редких охраняемых видов ПК ЮВК периодически пересматривался и изменялся в прошлом, он будет пересматриваться и в будущем в результате инвентаризационных работ и новейших исследований в области флористики и систематики.

На данном этапе исследования флоры ЮВК выделено 106 видов, не имеющих в настоящее время федерального и регионального статуса охраны (не включённых в Красные книги РФ и РК), но редких для флоры ПК ЮВК. В их числе есть таксоны, которые можно рассматривать в качестве «кандидатов» на занесение в Красные книги разного уровня.

Степень изученности охраняемых и не охраняемых редких таксонов ПК ЮВК остается недостаточно высокой. Для большинства РВ определена только общая ориентировочная численность. Число охраняемых редких видов с оценкой общей ориентировочной численности на территории 8-ми ПК колеблется от 30 (46,2%) на Агармыше (ПК 5) до 85 (72%) на Карадаге (ПК 1).

Для сохранения редких и исчезающих видов необходимы исследования растительного покрова с особым вниманием к выявлению мест произрастания видов, установлению конкретных границ и площадей распространения, оценке состояния популяций. Для особо редких и динамичных популяций растений требуется организация многолетних наблюдений. В настоящее время мониторинг численности и возрастной структуры популяций проводится за 25 редкими видами на территории 9-ти ПК.

Научно обоснованный способ сохранения редких видов – охрана в природной среде, в естественных экотопах особо охраняемых природных территорий. Только 78,9 км<sup>2</sup> (34,8%) из 227 км<sup>2</sup> исследуемой территории на данный момент имеют статус ООПТ. Желательно увеличение размеров площадей существующих ООПТ и создание новых ООПТ в районе пгт Кизилташ (ПК 6), Армутлукской долины (ПК 9), горного массива Френк-Мезер (ПК 10).

Необходимо создание охранных зон для всех ООПТ и безотлагательное утверждение разработанного Положения об охранной зоне Карадагского заповедника, как наиболее ценного и уникального ПК в ЮВК. Крайне важен запрет массовой застройки побережья, уничтожение сохранившихся фрагментов естественного растительного покрова, особенно степных сообществ, даже на эксплуатируемых землях.

Естественный растительный покров Юго-Восточного Крыма в различной степени нарушен, преобразован и чрезвычайно чувствителен к антропогенным нагрузкам, обладает низкой способностью к восстановлению. Для сохранения редких видов, необходимо охранять места естественного их произрастания, разработать оптимальные индивидуальные методы охраны РВ.

Целесообразно сформировать единую базу данных с информацией о РВ, поисковую аналитическую систему для обеспечения оперативного доступа к информации заинтересованных лиц о видах, произрастающих как на ОППТ, так и на не охраняемых территориях. В этой работе желательно участие не только специалистов-ботаников, но и краеведов-любителей.

Полноценные исследования раритетных видов флоры необходимы для объективной оценки состояния РВ, создания научной основы для обоснования включения конкретных видов в группу риска и расширения охранных списков различного ранга.

Данные о редких таксонах в настоящее время используются при обосновании создания новых и расширения уже существующих ОППТ, разработки предложений по поддержанию и повышению эффективности режимов их охраны, проведению различного рода экспертиз и, в конечном счете, должны постоянно учитываться при организации рационального природопользования в регионе.

В завершение настоящего обзора подчеркнем, что изучение растительного покрова горных районов со сложным рельефом, таких как ПК ЮВК, требует большей детальности и усилий по сравнению с равнинными территориями. В будущем информация о редких видах и фиторазнообразии в целом ПК будет дополняться, поэтому материалы данной статьи актуальны и репрезентативны только в настоящее время.

### **Благодарности**

Автор глубоко признателен д-ру биол. наук, проф. А.Н. Ене (Академия биоресурсов и природопользования, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского) за поддержку и помочь в подготовке материала к публикации; канд. биол. наук Ю.Д. Нухимовской (Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва) за просмотр рукописи и ценные замечания; главному специалисту ФГБУН «КНС – ПЗ РАН» Л.В. Знаменской за техническую помощь в оформлении статьи.

### **Список литературы**

1. Белинский И.Л., Лезина И.Н., Суперанская А.В. Крым. Географические названия. – Симферополь: Таврия-Плюс, 1998. – 158 с.
2. Белянина Н.Б., Шатко В.Г. Конспект флоры Енишарских гор (Восточный Крым) // Бюлл. Главного ботан. сада. – 1998. – Вып. 176. – С. 69–91.
3. Белянина Н.Б., Шатко В.Г. Дополнение к флоре Енишарских гор (Восточный Крым) // Бюлл. Главного ботан. сада. – 2000. – Вып. 181. – С. 92–96.
4. Білик Г.І., Ткаченко В.С. Некоторые особенности степной растительности Крымского полуострова // Укр. бот. журнал. – 1975. – Т. 32. – № 4. – С. 461–465.
5. Боков В.А. Климат // Экология Крыма. Справочное пособие; под ред. Н.В. Багрова, В.А. Бокова. – Симферополь: Крымское учебно-педагогическое государственное издательство, 2003. – С. 40–51.
6. Боков В.А., Костенко Н.С. Физико-географические особенности. Юго-Восточный Крым: Лисья бухта – Эчки-Даг // Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика», 1999. – С. 16–23.

7. Брижатая А.А., Петропавловская Б.С., Селедец В.П. Экотопы и пути охраны редких видов сосудистых растений Дальнего Востока // Вестник КрасТАУ. – 2010. – №3. – С. 94–101.
8. Быков Б.А. Геоботанический словарь. – Алма-Ата: Изд. «Наука» Казахской ССР. 1973. – 34 с.
9. Вульф Е.В. Флора Крыма. – Ялта, М.-Л.: ОГИЗ. Сельхозгиз, 1927–1969. Т. 1–3.
10. Вульф Е.В. Флора Крыма. Т. 2. Вып. 1. – М.; Л.: Огиз- Сельхозгиз, 1947. – 330 с.
11. Вульф Е.В. Флора Крыма. Т. 3. Вып. 1. – М.: Сельхозгиз, 1957. – 86 с.
12. Вульф Е.В. Флора Крыма. Т. 3. Вып. 2. – М.: Колос, 1966. – 256 с.
13. Вульф Е.В. Флора Крыма. Т. 3. Вып. 3. – Ялта: Изд-во Государственного Никитского ботанического сада, 1969. – 396 с.
14. Голубев В.Н. Биологическая флора Крыма. 2-е издание. – Ялта: НБС-ННЦ, 1996. – 86 с.
15. Голубев В.Н., Косых В.М. Методические указания по изучению редких и исчезающих растений флоры Крыма. – Ялта: ГНБС, 1980. – 30 с.
16. Дзевановский С.А. Ботанические экскурсии в "Осминские дубки". – Симферополь: Крымгосиздат, 1926. – 17 с.
17. Дзенс-Литовская Н.Н. Растильность степного Крыма // Ученые записки ЛГУ. Сер. географических наук. – 1950. – Вып. 7. – № 125. – С. 123–219.
18. Дідух Я.П. Рослинність заказника «Агармиш» (Крим) // Укр. ботан. журн. – 1981. – Т. 38. – № 2. – С. 96–101.
19. Дідух Я.П. (ред.). Екофлора України. Т. 6. – Київ: Фітосоціоцентр, 2010. – 422 с.
20. Дидух Я.П., Шеляг-Сосонко Ю. Р. Карадагский государственный заповедник. Растильный мир. – К.: Наукова думка, 1982. – 152 с.
21. Дидух Я.П. Растильный покров горного Крыма (структуря, динамика, эволюция и охрана). – Киев: Наук. думка, 1992. – 256 с.
22. Добрынин Б.Ф. Характер берегов восточного Крыма от Меганома до Карадага // Ученые записки МГУ. – 1938. – Вып. 19. – С. 7–23.
23. Драган Н.А. Почвы // Природа Карадага. – Киев: Наукова думка, 1989. – С. 40–45.
24. Драган Н.А. Почвенные ресурсы Крыма. – Симферополь: ДОЛЯ. 2004, – 208 с.
25. Екофлора України. Том 3 / Я. П. Дідух (відпов. ред.). – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 496 с.
26. Ена А.В. Анnotated чеклист эндемиков флоры Крыма // Укр. ботан. журн. – 2001. – Т. 58. – № 6. – С. 667–677.
27. Ена А.В. Созологическая квалификация эндемиков флоры Крыма // Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана: Тематический сборник научных работ. – 2002. – Вып. 12. – С. 9–17.
28. Ена А.В. Природная флора Крымского полуострова. – Симферополь: Н. Оріанда, 2012. – 232 с.
29. Ена Ан.В., Ена Ал.В. *Lepidium turczaninowii* Lipsky – узкий эндемик флоры Крыма // Бюлл. Главного ботан. сада. – 2001. – Вып. 182. – С. 57–64.
30. Ена В.Г., Ена Ал. В., Ена Ан. В. Заповедные ландшафты Тавриды. – Симферополь: Бизнес-Информ, 2004. – 424 с.
31. Ена В.Г., Ена Ал.В., Ена Ан.В. Краткий географический словарь Крыма. – Симферополь: Бизнес-Информ, 2009. – 263 с.
32. Ільїнська А.П. Таксономічний аналіз роду *Conringia* Heist. ex Fabr. (Brassicaceae) // Український ботанічний журнал. – 2009. – Т. 66(2). – С. 149–161.
33. Зенкович В.П. Геоморфологические наблюдения на побережье Восточного Крыма (на участке Карадаг – Меганом) // Ученые записки МГУ. – 1938. – Вып. 19. – С. 25–50.
34. Ільїнська А.П. Таксономічний аналіз роду *Conringia* Heist. ex Fabr. (Brassicaceae) // Український ботанічний журнал. – 2009. – Т. 66(2). – С. 149–161.

35. Калистая М.С., Новасад В.В., Щербакова О.В., Крицкая Л.И., Миронова Л.П. Сравнительная характеристика местопроизрастаний близкородственных видов *Crambe koktebelica* (Junge) N.Busch и *Crambe mitridatis* juz. в Крыму // Научная дискуссия: вопросы физики, химии, биологии: материалы VI международной заочной научно-практической конференции. 31 января 2013 г. – Москва: Изд. «Международный центр науки и образования», 2013. – С. 45–56.
36. Каліста М.С., Щербакова О.Ф., Новасад В.В. Поліваріантність онтоморфогенезу кримського ендемічного раритетного виду *Anthemis sterilis* Steven (Asteraceae Bercht. et J. Presl.) // Інтродукція рослин. – 2015. – №3. – С. 25–34.
37. Каменских Л.Н. Агармыш как приоритетная территория в заповедном комплексе Крыма // Заповедники Крыма – 2007. Материалы IV Международной научно-практической конф. (2 ноября 2007 г., Симферополь). – Ч. 1. Ботаника. Общие вопросы охраны природы. – Симферополь: СПД Барановский А.Э., 2007. – 408 с.
38. Каменских Л.Н. Флора и растительность хребта Агармыш // Бюлл. ГБС. – 2011. – Вып.195. – С. 91–129.
39. Каменских Л.Н., Миронова Л.П. Конспект флоры высших сосудистых растений Карадагского природного заповедника НАН Украины (Крым) // Карадаг (История, геология, ботаника, зоология). Сборник науч. тр. Кн.1-я. – Симферополь: СОНAT, – 2004. – С. 161–223.
40. Кечайкин А.А., Шмаков А.И., Скапцов М.В., Ермаков Н.Б., Коржаневский В.В. Дополнения к флоре Крымского полуострова // *Turczaninowia*. – 2018. – Т. 21(4). – С. 5–8. – DOI: 10.14258/turczaninowia.21.4.1
41. Климатический атлас Крыма. – Симферополь: «Таврия-Плюс», 2000. – 118 с.
42. Клюкин А.А. Геоморфология // Природа Карадага. – Киев: Наукова думка, 1989. – С. 69–71.
43. Клюкин А.А., Коржаневский В.В., Щепинский А.А. Эчки-Даг. – Симферополь: Таврия, 1990. – 128 с.
44. Клюкин А.А., Михаленок Д.К. Орогидрография // Природа Карадага. – Киев: Наукова думка, 1989. – С. 25–29.
45. Кобечинская В.Г., Отурина И.П., Казакова И.Н. Многолетняя динамика растительности общегосударственного заказника «Агармышский лес» // Заповедники Крыма. Мат-лы III научн. конф. – Симферополь: Экология и мир, 2005. – Ч. I. – С. 183–188.
46. Кожаринов А.В., Морозова О.В. Система локальных территорий Восточной Европы для организации мониторинга разнообразия флоры // Мониторинг биоразнообразия. – М.: ИПЭЭ РАН, 1997. – С. 94–99.
47. Коржаневский В.В., Клюкин А.А. Растительность бедлендов Крыма // Экология. – 1989. – № 6. – С. 26–33.
48. Котов М.І. Рослинність Карадагу та його околиць // Укр. бот. журн. – 1956. – № 4. – С. 38–44.
49. Котов М.И. Растительность Карадага // Карадаг. – Киев: Изд-во АН СССР, 1959. – С. 19–25.
50. Кочкин М.А. Почвы, леса и климат Горного Крыма и пути их рационального использования // Науч. тр. ГНБС. – 1967. – Т. 37. – 368 с.
51. Крайнюк Е.С., Рыфф Л.Э. Полуостров Меганом: оценка современного уровня фиторазнообразия // Заповедники Крыма на рубеже тысячелетий (материалы республиканской конференции 27 апреля 2001 г., Симферополь, Крым). – Симферополь: Таврический национальный университет имени В.И.Вернадского, 2001. – С. 205–210.
52. Крайнюк Е.С., Рыфф Л.Э. К изучению флоры полуострова Меганом // Сборник научных трудов ГНБС. – 2004. – Т. 123. – С. 93–103.

53. Крайнюк Е.С., Рыфф Л.Э. Полуостров Меганом: оценка современного уровня фиторазнообразия // Заповедники Крыма: заповедное дело, биоразнообразие, экообразование: матер. III науч. конф. 22 апреля 2005 г. – Симферополь: Экология и мир, 2005. – С. 205–210.
54. Красная книга Республики Крым. Растения, водоросли и грибы // Отв. ред. А.В. Ена, А.В. Фатерыга. – Симферополь: ООО «ИТ Ариал», 2015. – 480 с.
55. Красная книга Российской Федерации (растения и грибы) // Р.В. Камелин и др. (сост.). – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. – 885 с.
56. Кузьманенко О.Е. Об уточнении местонахождения видов боярышников (*Crataegus* L.) в Карадагском природном заповеднике // Флора и растительность сухопутной территории / Летопись природы. Том XXI. 2004 год. – Симферополь, СОНAT, 2006. – С. 80–95.
57. Кукушин О.В., Василенко С.Н. О находке нового для Карадага кустарника – таволги зверобоелистной, *Spiraea hypericifolia* Lam. (Roseae) // Летопись природы. – Симферополь: Н. Оріанда, 2010. – Т. 25. – С. 51–53.
58. Лавренко Е.М. Степи СССР // Растительность СССР. Т. 2. – М.: Наука, 1940. – С. 1–265.
59. Лавренко Е.М. Степи и сельскохозяйственные земли на месте степей // Растительный покров СССР. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1956. – С. 593–720.
60. Ларина Т.Г. Географические варианты можжевеловых лесов Крыма // Бюлл. ГНБС. Ялта. – 1988. – Вып. 67. – С. 8–13.
61. Лебединский В.И. С геологическим молотком по Крыму. – М.: Недра, 1982. – 160 с.
62. Лебединский В.И., Макарова Н.Н. Вулканализм горного Крыма. – Киев: Изд-во АН УССР, 1962. – 207 с.
63. Левинсон-Лессинг Ф.Ю., Дьяконова-Савельева Е.Н. Вулканическая группа Карадага в Крыму. – Л.: Изд-во АН СССР, 1933. – 151 с.
64. Летухова В.Ю. Состояние популяции *Crataegus pojarkovae* Kossykh по результатам мониторинга в 2007 г. Растительный мир // Летопись природы. Том XXIV. 2007 год. – Симферополь: «Н. Оріанда», 2009. – С. 114–117.
65. Летухова В.Ю. Эколо-ценотическая характеристика *Ophrys apifera* и *O. oestrifera* на территории ботанического заказника Тепе-Оба в Крыму // Экосистемы. – 2017 а. – Вып. 10. – С. 12–18.
66. Летухова В.Ю. Возрастной состав и динамика численности популяции *Orchis punctulata* (Orchidaceae) на территории ботанического заказника Тепе-Оба // Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России: материалы XIX Международной научной конференции с элементами научной школы молодых ученых (г. Махачкала, 4–5 ноября 2017 г.). – Махачкала: Типография ИПЭ РД. – 2017 б. – С. 213–215.
67. Летухова В.Ю., Потапенко И.Л. Новые данные о популяциях редкого охраняемого вида *Crataegus tournefortii* Griseb. в Юго-Восточном Крыму // Бюлл. Гос. Никитск. бот. сада. – 2015. – Вып. 116. – С. 27–33.
68. Летухова В.Ю., Потапенко И.Л. Популяционный анализ рода *Ophrys* на территории ботанического заказника Тепе-Оба // Юг России: экология, развитие. – 2017. – Т. 12. – № 4. – С. 71–78.
69. Летухова В. Ю., Потапенко И.Л. Оценка стратегий жизни орхидных, произрастающих на территории горного массива Кизилташ (Крым) // Экосистемы. – 2018. – Вып. №16 (46). – С. 68–74.
70. Майоров С.Р. Истоды (*Polygala* L., *Polygalaceae* R. Br.) во флоре Восточной Европы. Некоторые комментарии // Herba: Московский электронный ботанический журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://herba.msu.ru/journalsplus/Herba/10/> (дата обращения 01.09.2018)

71. Малеев В.П. Можжевеловый лес на мысе Мартыян в Южном Крыму // Бот. журн. – 1933. – Т. 18. – № 6. – С. 446–468.
72. Малеев В.П. Растительность Южного Крыма // Тр. ГНБС. – 1948. – Вып. 1 – 2. – Т. 25. – С. 29–48.
73. Миркин Б.М., Розенберг Г.С. Толковый словарь современной фитоценологии. – М.: Наука, 1983. – 134 с.
74. Миронова Л.П. Флора и растительность //Юго-Восточный Крым: Лисья бухта – Эчки-Даг. – Севастополь, НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика», 1999 а. – С. 23–37.
75. Миронова Л.П. Высшие сосудистые растения (анnotatedный список видов) // Юго-Восточный Крым: Лисья бухта – Эчки-Даг. – Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-Гидрофизика», 1999 б. – С. 77–102.
76. Миронова Л.П. Редкие виды // Наземная флора и растительность. Летопись природы. Том XIX. 2002 год. – Симферополь: СОНAT, 2003. – С. 48–52.
77. Миронова Л.П. Наземная флора и растительность. Редкие виды / Л.П. Миронова // Летопись природы 2005 года. Т. XXII. – Симферополь: СОНAT, 2007 а. – С. 87–140.
78. Миронова Л.П. Памятник природы «Лисья бухта-Эчкидаг» в Юго-восточном Крыму на грани уничтожения // Материалы IV Международной научно-практической конференции «ЗАПОВЕДНИКИ КРЫМА – 2007» 2 ноября 2007 г., Симферополь, Крым. – Симферополь: СПД Барановский А.Э., 2007 б. – С. 332–329.
79. Миронова Л.П. Редкие виды. Растительный мир // Летопись природы 2007 года. Том XXIV. – Симферополь: «Н. Ореанда», 2009. – С. 78–114.
80. Миронова Л.П. Фиторазнообразие – как показатель ценности природных ландшафтов на примере территории Юго-восточного Крыма) // Биоразнообразие и устойчивое развитие. – Симферополь: КНЦ, 2010 а. – С. 88–90.
81. Миронова Л.П. Редкие виды. Растительный мир / Л.П. Миронова // Летопись природы 2008 года. Том XXV. – Симферополь: «Н. Ореанда», 2010 б. – С. 81–104.
82. Миронова Л.П. Проблемы сохранения природных ландшафтов на примере Юго-восточного Крыма // Природа и общество: общее и особенное. Серия «Социоестественная история». Генезис кризисов природы и общества в России / Под ред. Кульпина - Губайдулинав Э.С., соредактор Борисова Е.А. Вып. XXXV – М.: Издательский дом «Энергия», 2011. – С. 212–219.
83. Миронова Л.П. Некоторые проблемы сохранения биоразнообразия в Юго-восточном Крыму // Заповедники Крыма. Биоразнообразие и охрана природы в Азово-Черноморском регионе / Материалы VII Международной научно-практической конференции (Симферополь, 24–26 октября 2013 г.). – Симферополь: ТНУ, 2013. – С. 230–236.
84. Миронова Л.П. Влияние жизнедеятельности *Sus scrota* L на состояние популяций редких видов растений / Заповедники Крыма. Биологическое и ландшафтное разнообразие, охрана и управление // Материалы VIII Международной научно-практической конференции (Симферополь, 28–30 апреля 2016 г.). – Симферополь: ТНУ, 2016 а. – С. 212–214.
85. Миронова Л.П. Сохранение дикой природы и расширение особо охраняемых природных территорий в Крыму // Природа и общество. Технологии обеспечения продовольственной и экологической безопасности / Под редакцией Н.О. Ковалевой, С.К. Костовска, Е.А. Борисовой. Социоестественная история. – 2016 б. – Вып. XL. – С. 126–135.
86. Миронова Л.П. Оценка фиторазнообразия природных комплексов Юго-восточного Крыма // Биоразнообразие: подходы к изучению и сохранению. Материалы Международной научной конференции, посвященной 100-летию кафедры ботаники Тверского государственного университета (Тверь, 8–11 ноября 2017 г.). – Тверь: Тверской госуниверситет, 2017 а. – С. 246–250.

87. Миронова Л.П. Социально-экологические проблемы Восточного Крыма в прошлом и настоящем: причины возникновения, пути решения // История и современность. – 2017 б. – Вып. 1. – С. 79–106.
88. Миронова Л.П., Епихин Д.В., Вахрушева Л.П., Каменских Л.Н., Шатко В.Г. Характеристика ключевых территорий локальной экосети Восточного Крыма по флористическим данным // Природа Восточного Крыма. Оценка биоразнообразия и разработка проекта локальной экологической сети. – Киев: Українське товариство охорони птахів & ТОВ «ДІА», 2013. – С. 100–118.
89. Миронова Л.П., Каменских Л.Н. Сосудистые растения Карадагского заповедника // Сер. Флора и фауна заповедников. – 1995. – Вып. 58. – 104 с.
90. Миронова Л.П., Каменских Л.Н. Новые виды растений // Летопись природы. Том XX. 2003 год. – Симферополь: СОНAT. 2004. – С. 63–68.
91. Миронова Л.П., Каменских Л.Н., Костенко Н.С., Бескаравайный М.М., Кукушкин О.В., Будашкин Ю.И. Сохранение видов растений и животных естественных мест обитания, которые внесены в важные для Украины международные перечни // Летопись природы 2006 года. Том XXIII. – Симферополь: «Н. Оріанда», 2008. – С. 315–339.
92. Миронова Л.П., Костенко Н.С., Дидух Я.П., Онищенко В.А., Войцехович А.О. ПЗ Карадазький / В.А. Онищенко, Г.Л. Андрієнко (ред.). // Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Частина 1. Біосферні заповідники. Природні заповідники. – К.: Фітосоціоцентр, 2012. – С. 170–197.
93. Миронова Л.П., Курочкина О.Г. Влияние жизнедеятельности *Sus scrofa* L. на почвенно-растительный покров Карадагского природного заповедника// Структура и функциональная роль животного населения в природных и трансформированных экосистемах. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – С.174–176.
94. Миронова Л.П., Курочкина О.Г. Влияние жизнедеятельности кабана на состояние редких видов // Наземная флора и растительность. Летопись природы. Том XIX. 2002 год. – Симферополь: СОНAT, 2003. – С. 52–58.
95. Миронова Л.П., Лапченко Е.В., Шатко В.Г. Редкие виды. Флора и растительность сухопутной территории // Летопись природы 2004 года. Том XXI. – Симферополь: СОНAT, 2006. – С. 110–135.
96. Миронова Л.П., Летухова В.Ю. Гербарій Карадазького природного заповідника // Гербарії України. Index Herbariorum Ucrainicum; редактор-укладач к.б.н. Н.М. Шиян. – Київ: Альтерпрес, 2011. – С. 295–298.
97. Миронова Л.П., Нухимовская Ю.Д. Итоги и проблемы сохранения фиторазнообразия в Карадагском природном заповеднике НАН Украины // Морозова А.Л., Гнюбкин В. Ф. (ред.). Карадаг. История, биология, археология: Сборник научных трудов, посвященный 85-летию Карадагской научной станции. – Симферополь: Сонат, 2001. – С. 45–63.
98. Миронова Л.П., Таран Т. В. Состояние раритетного генофонда высших сосудистых растений Карадагского природного заповедника НАН Украины // Флорология та фітосозологія. – Т.1 / Збірник наукових праць, присвячених 30-річчю Всеукраїнської секції охорони рослинного світу ім. Б.В. Заверухи Українського товариства охрани природи. – Київ: Фітон, 2011. – С. 89–102.
99. Миронова Л.П., Фатерыга В.В. Состояние *Lepidium turczaninowii* Lipsky в Юго-восточном Крыму / Л.П. Миронова, В.В // Флорология та фітосозологія. – 2014. – Том 3–4. – С. 166–179.
100. Миронова Л.П., Фатерыга В.В. Мониторинг редких видов. Растительный мир // Летопись природы 2014 года. Том XXXI. Рукопись. – Карадаг, 2015. – С. 45–56.
101. Миронова Л.П., Фатерыга В.В. Флора Карадагского природного заповедника (сосудистые растения) // 100 лет Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского:

- Сб. научн. тр.; ред. А.В. Гаевская, А.Л. Морозова. – Симферополь: Н. Оріанда, 2015. – С. 160–204.
102. *Миронова Л.П., Шатко В.Г.* Популяционное изучение редких растений в Карадагском заповеднике // Редкие виды растений в заповедниках / Сб. науч. тр. ЦНИЛ Главохоты РСФСР. – М: ЦНИЛ Главохоты РСФСР, 1987. – С. 95–108.
103. *Миронова Л.П., Шатко В.Г.* Конспект флоры хребта Эчкидаг в Юго-Восточном Крыму // Бюлл. Главного ботан. сада. – 2001. – Вып. 182. – С.64–85.
104. *Миронова Л.П. Шатко В.Г.* Мониторинг редких, исчезающих и охраняемых растений флоры Крыма в Карадагском природном заповеднике НАН Украины // Морозова А.Л., Гнюбин В.Ф. (ред.). Карадаг. История, геология, ботаника, зоология: Сборник научных трудов, посвященный 90-летию Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского и 25-летию Карадагского природного заповедника. Книга 1. – Симферополь: СОНAT, 2004. – С. 224–249.
105. *Миронова Л.П., Шатко В.Г.* Состояние и степень изученности флористического разнообразия приоритетных территорий Юго-Восточного Крыма // Материалы III научной конференции «Заповедники Крыма: Заповедное дело, биоразнообразие, экообразование» 22 апреля 2005 г., Симферополь, Крым. – Симферополь: ТНУ, 2005. – С. 225–231.
106. *Миронова Л.П., Шатко В.Г.* Оценка состояния фиторазнообразия природных комплексов пгт Краснокаменка // (Материалы IV Международной научно-практической конференции «ЗАПОВЕДНИКИ КРЫМА – 2007» 2 ноября 2007, Симферополь, Крым). – Симферополь: СПД Барановский А.Э., 2007. – С. 108–115.
107. *Миронова Л.П., Шатко В.Г.* Редкие виды. Растительный мир // Летопись природы 2006 года. Том XXIII. Симферополь: Н. Оріанда, 2008. – С. 120–151.
108. *Миронова Л.П., Шатко В.Г.* Флора и растительность хребта Узунсырт и Баракольской котловины в Восточном Крыму // (Материалы V Международной научно-практической конференции «ЗАПОВЕДНИКИ КРЫМА. Теория, практика и перспективы заповедного дела в Черноморском регионе» Симферополь 22–23 октября 2009 г.). – Симферополь: СПД Барановский А.Э., 2009 а. – С. 1999–2005.
109. *Миронова Л.П., Шатко В.Г.* Конспект флоры хребта Узунсырт и Баракольской котловины в Восточном Крыму // Бюлл. Главного ботан. сада. – 2009 б. – Вып. 195. – С. 74–102.
110. *Миронова Л.П., Шатко В.Г.* Оценка состояния раритетной флоры полуострова Меганом (Юго-восточный Крым) // Биоразнообразие и устойчивое развитие. Крым. – Симферополь: КНЦ, 2010. – С. 90–93.
111. *Миронова Л.П., Шатко В.Г.* Итоги изучения раритетных видов флоры Восточного Крыма // Флорогія та фітосозологія. (Теоретические и практические аспекты флорологии и фитосозологии) – Т.2. – Київ: Центр оперативной полиграфии Фітон, 2011. – С. 29–38.
112. *Миронова Л.П., Шатко В.Г.* Полуостров Меганом в Юго-восточном Крыму (природные условия, флора, растительность) // Геополитика и экогеодинамика регионов. –2013. – Том 9. – Вып. 2. – Часть 2. – С. 26–64.
113. *Мосякін С.П.* Рослини України у світовому Червоному списку // Укр. ботан. журн. – 1999. – Т. 56. – № 1. – С.79–88.
114. *Муратов М.В.* Геологический очерк восточной оконечности Крымских гор // Тр. Моск. Геологоразвед. Ин-та. – 1937. – Т. 7. – С. 21–121.
115. *Муратов М.В.* Краткий геологический очерк строения Крымского полуострова. – М.: Госгеолтехиздат, 1960. – 207 с.
116. *Определитель высших растений Крыма* / Под общ. ред. Н.И. Рубцова. – Л.: Наука, 1972. – 550 с.

117. *Определитель высших растений Украины* / Доброчаева Д.Н., Котов М.И., Прокудин Ю.Н. и др. – Киев: Наукова думка, 1987. – 548 с.
118. *Павлова Н.Н. Физическая география Крыма*. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1964. – 106 с.
119. *Рубцов Н.И. Краткий обзор типов растительности Крыма* // Бот. журн. – 1958. – Т. 43. – № 4. – С. 572–577.
120. *Рубцов Н.И. Ксерофитные редколесья, нагорные ксерофиты и субтропические степи* // Растительный покров СССР. Т. 2. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1956. – С. 573–580.
121. *Рубцов Н.И. О саванноидном типе растительности в Крыму* // Бот. журн. Проблемы современной ботаники. – 1965. – Т. 1. – С. 307–311.
122. *Рубцов Н.И. Растительный мир Крыма*. – Симферополь: Таврия, 1978. – 128 с.
123. *Рубцов Н.И., Ларина Т.Г. Эколого-фитоценотический и географический анализ шибляковых сообществ Горного Крыма* // Тр. ГНБС. – 1975. – Т. 62. – С. 5–82.
124. *Рыфф Л.Э. О некоторых таксонах сосудистых растений, вновь обнаруженных в Крыму* // Укр. ботан. журн. – 2012. – Т. 69. – № 2. – С. 223–231.
125. *Рыфф Л.Э. Conringia clavata Boiss.* // Красная книга Республики Крым. Растения, водоросли и грибы. – Симферополь: ООО «ИТ «АРИАЛ», 2015 а. – С. 186.
126. *Рыфф Л.Э. О находках новых и редких для флоры Крыма видов* // VI відкритий зізд фітобіологів Причорномор'я. Херсон – Лазурнє, 19 травня 2015 р. / Відп. ред. М.Ф. Бойко. – Херсон: ХДУ, 2015 б. – С. 71–74.
127. *Рыфф Л.Э. Редкие биотопы эрозионно-денудационных ландшафтов Юго-восточного Крыма* // Бюллетень ГНБС. – 2017 а. – Вып. 124. – С. 61–98.
128. *Рыфф Л.Э. Биотопическая структура ландшафтно-рекреационного парка «Тихая бухта» (Юго-восточный Крым)* // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. – 2017 б. – Т. 26. – №4. – С. 86–98.
129. *Сарандинаки В.Н. Материалы для флоры окрестностей г. Феодосии. Ч.1* // Изв. Императ. ботан сада Петра Великого. – 1916. – Т. 17. – Вып. 1. – С. 1–39
130. *Сарандинаки В.Н. Материалы для флоры окрестностей г. Феодосии. Ч.2.* // Изв. Гл. ботан. сада (СПб). – 1917. – Т. 18. – Вып. 1. – С. 180–245.
131. *Сарандинаки В.Н. К флоре Восточного Крыма: Систематический список дикорастущих растений Карадага и прилегающих районов* // Тр. Карадаг. биол. станции. – 1930. – Вып. 3. – С. 13–38;
132. *Сарандинаки В.Н. К флоре Восточного Крыма: Систематический список дикорастущих растений Карадага и прилегающих районов* // Тр. Карадаг. биол. станции. – 1931. – Вып. 4. – С. 145–227.
133. *Серёгин А.П. Новые и редкие виды рода Allium L. (Alliaceae) флоры Крыма и некоторые вопросы систематики представителей рода* // Бюлл. МОИП. Отд. Биол. – 2004. – Т. 109. – № 5. – С. 43–47.
134. *Серёгин А.П. Род Allium L. (Alliaceae) во флоре Восточной Европы*. Дисс. ... канд. Биол. Наук. – М. 2007. – 242 с.
135. *Фатерыга В.В. Селитрянка Шобера* // Красная книга Республики Крым. Растения, водоросли и грибы // Отв. ред. А.В. Ена, А.В. Фатерыга – Симферополь: ООО «ИТ «АРИАЛ», 2015. – С. 334.
136. *Фатерыга В.В. Состояние ценопопуляций Glaucium flavum (Papaveraceae) на Южном берегу Крыма* // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический. – 2018. – Т. 123. – № 2. – С. 70–81.
137. *Фатерыга А.В., Фатерыга В.В. О произрастании Epipactis kryumontana (Orchidaceae) в Карадагском заповеднике* // Заповедники Крыма. Биологическое и ландшафтное разнообразие, охрана и управление. Материалы VIII Международной научно-практической конференции (Симферополь, 28–30 апреля 2016 г.). – Симферополь: ТНУ, 2016. – С. 256–258.

138. Фатерыга В.В., Фатерыга А.В. Дополнения к флоре сосудистых растений Карадагского заповедника (Крым) // Заповедная наука. – 2019. 4(2). – С. 67 – 92.
139. Флора европейской части СССР/ Восточной Европы, 1974-2004
140. Флора европейской части СССР / А.Н. Федоров (ред.). – Л. Наука, 1974. – Т. 1. – 404 с.
141. Флора европейской части СССР / А.Н. Федоров (ред.). – Л. Наука, 1976. – Т. 2. – 236 с.
142. Флора европейской части СССР / А.Н. Федоров (ред.). – Л. Наука, 1978. – Т. 3. – 259 с.
143. Флора европейской части СССР/ А.Н. Федоров (ред.). – Л. Наука, 1979. – Т. 4. – 356 с.
144. Флора европейской части СССР / А.Н. Федоров (ред.). – Л. Наука, 1981 – Т. 5. – 380 с.
145. Флора европейской части СССР / А.Н. Федоров (ред.). – Л. Наука, 1987. – Т. 6. – 254 с.
146. Флора европейской части СССР / А.Н. Федоров (ред.). – Л. Наука, 1989. – Т. 7. – 412 с.
147. Флора европейской части СССР / А.Н. Федоров (ред.). – Л. Наука, 1994. – Т. 8. 317с.
148. Цвелеев Н.Н. Poaceae Barnh. (Graminae Juss. nom. altern.) – злаки // Флора европейской части СССР / А.Н. Федоров (ред.). Т. 1. – Л.: Наука, 1974. – С. 117–368.
149. Цырина Т.С. Очерк растительности горы Агармыш // Зап. Никит. ботан. сада. – 1930. – № 11. – Вып. 2. – С. 31–46.
150. Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). – СПб.: Мир и семья, 1995. – 990 с.
151. Червона книга України. Рослинний світ // За ред. Я.П. Дідуха. – К.: Глобалконсалтінг, 2009. – 912 с.
152. Шатко В.Г. Редкие, исчезающие и эндемичные растения флоры Крыма на Карадаге и вопросы их охраны // Бюлл. ГБС АН СССР. – 1979. – № 114. – С. 28–32.
153. Шатко В.Г. Анализ локальных флор Юго-Восточного Крыма // Бюлл. Главного ботан. сада. – 2014. – №1. – С. 25–38.
154. Шатко В.Г., Волковская И.Р., Миронова Л.П. О находке *Nectaroscordum meliophilum* Juz. на Карадаге // Бюлл. Главного ботан. Сада. – 1994. – Вып 160. – С. 29–30.
155. Шатко В.Г., Миронова Л.П. Новые виды растений для флоры Карадагского государственного заповедника // Бюлл. Главного ботан. Сада. – 1986 а. – Вып. 142. – С. 47–50.
156. Шатко В.Г., Миронова Л.П. Состояние популяций некоторых редких растений в Карадагском государственном заповеднике // Бюлл. Главного ботан. сада. – 1986 б. – Вып. 141. – С. 61–67.
157. Шатко В.Г., Миронова Л.П. Орхидные Карадагского заповедника: распространение, численность и структура ценопопуляций // Бюлл. Главного ботан. сада. – 1988. – Вып. 148. – С. 67–71.
158. Шатко В.Г., Миронова Л.П. Результаты мониторинга ценопопуляции *Orchis purpurea* Huds. в Карадагском заповеднике (Крым) // Бюлл. Главного ботан. сада. – 2000 а. – Вып. 179. – С. 52–59.
159. Шатко В.Г., Миронова Л.П. Особенности развития искусственной популяции *Cyclamen kuznetzovii* Kotov et szernova в Карадагском заповеднике // Бюлл. Главного ботан. сада. – 2000 б. – Вып. 180. – С. 56–61.
160. Шатко В.Г., Миронова Л.П. Конспект флоры района Кизилташа (Восточный Крым) // Бюлл. Главного ботан. сада. – 2008. – Вып. 194. – С. 75–94.
161. Шатко В.Г., Миронова Л.П. Конспект флоры хребта Тепе-Оба в Юго-восточном Крыму // Бюлл. Главного ботан. сада. – 2011. – Вып. 197. – С. 43–71.
162. Шведчикова Н.К. Нагорноксерофитная растительность района Судака в Восточном Крыму. – М.: Мин. Высш. и средн. спец. образ. СССР. Редкол. Журн. «Биологические науки». Деп. №4656-82 Деп., 1982. – 12 с.
163. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Дубові ліси з *Quercus pubescens* Willd. південного заходу УРСР // Укр. бот. журн. – 1975. – Т. 32. – № 1. – С. 109–112.
164. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Дідух Я.П Рідколісся ялівцю високого (*Junipereta excelsae*) у Криму та аналіз їх флори // Укр. бот. журн. – 1975. – № 6. – С. 753–762.

- 165.Шеляг-Сосонко Ю.Р. Широколиственные леса // Растительность европейской части СССР. – Л.: Наука, 1980. – С. 143–161.
- 166.Bilz M., Kell S.P., Maxted N., Lansdown R.V. European Red List of Vascular Plants. – Luxemburg: Publications Office of the European Union, 2011. – 132 p.
- 167.Black Sea Red Data Book. – New York: UNOPS, 1999. – 413 p.
- 168.Govaerts R., Paton A., Harvey Y., Navarro T., del Rosario García-Peña M. 2005–2018. World checklist of Lamiaceae. Royal Botanic Gardens, Kew. Available from: [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://apps.kew.org/wcsp/> (дата обращения: 10.07.2017).
- 169.Davies C.E., Moss D., Hill M.O. EUNIS habitat classification revised [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/eunis/eunis-habitatclassification/documentation/eunis-2004-report.pdf> (дата обращения: 10.07.2017).
- 170.Mosykin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular Plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. – Kiev: M.G. Kholodny Institute of Botany, 1999. – 345 p.
- 171.Prina A.O. Taxonomic review of the genus *Crambe* sect. *Crambe* (Brassicaceae, Brassiceae) // Anales del Jardín Botánico de Madrid. – 2009. – Vol. 66(1). – P. 7–24. – DOI: 10.3989/ajbm.2186
- 172.Revised Annex I of Resolution 6 (1998) of the Standing Committee to the Bern Convention. – Strasbourg, 2011. – 34 p.
- 173.Von Raab-Straube E., Raus T. Euro Med-Checklist Notulae, 8. *Willdenowia*. – 2017. – № 47 (3). – pp. 293–309. – DOI: 10.3372/wi.47.47311.
- 174.Von Raab-Straube E., Raus T. Euro Med-Checklist Notulae, 9. *Willdenowia*. – 2018. – № 48(2). – pp. 195–220. – DOI: /10.3372/wi.48.48203.
- 175.Fateryga A.V., Popovich A. V., Fateryga V.V., Averyanova E.A., Kreutiza C.A.J. / New data on the genus *Epipactis* (Orchidaceae) in the North Caucasus with description of a new species // Phytotaxa. – 2018. – Vol. 358. – № 3. – pp. 278–288.
- 176.Плантиарий: открытый онлайн атлас-определитель растений и лишайников России и сопредельных стран. 2007–2019 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.plantarium.ru/> (дата обращения: 10.07.2017).
- 177.Závorka J. *Orobanche kochii* and *O. elatior* (Orobanchaceae) in central Europe // Acta Musei Moraviae. Scientiae Biologicae. – 2010. – V. 95. – N 2. – P. 77–119.
- 178.Seregin A.P. *Allium nathaliae* (Alliaceae), a new species from the Crimea (Ukraine, Europe), and taxonomic notes on the related species *A. erubescens* C. Koch. // Wulfenia. – 2004. – V. 11. – P. 15–28.
- 179.Seregin A.P. A new subspecies of *Allium decipiens* (sect. *Melanocrommyum*, Alliaceae) from the Crimean and NW Caucasus Mts // Phytologia Balcanica. – 2007. – V. 13. – № 2. – pp. 193–204.
- 180.Seregin A.P. *Allium tarkhankuticum* (Amaryllidaceae), a new species of section *Oreiprason* endemic to the Crimean steppe, Ukraine // Phytotaxa. – 2012. – V. 42. – pp. 9–18.
- 181.Seregin A.P. Moscow University Herbarium (MW). Version 1.58. Lomonosov Moscow State University. Occurrence dataset. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://doi.org/10.15468/cpnhcc> (дата обращения: 10.07.2017).
- 182.Tutin T.G., Wood D. 1972. *Teucrium* L. In: T.G. Tutin, V.H. Heywood, N.A. Burges, D.M. Moore, D.H. Valentine, S.M. Walters, D.A. Webb (Eds.) // *Flora Europaea*. – 1972. – Vol. 3. – pp. 129–135.
- 183.World Checklist of Selected Plant Families / The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.kew.org/wcsp/> (дата обращения: 10.07.2017).

**RARE VASCULAR PLANTS IN FLORA OF THE SOUTHEASTERN CRIMEA  
NATURAL COMPLEXES: DISTRIBUTION, QUANTITATIVE COMPOSITION,  
STATE DEGREE OF KNOWLEDGE, PROBLEMS OF PROTECTION**

**Mironova L.P.**

*T.I.Vyazemsky Karadag Scientific Station – Nature Reserve of the RAS,  
Kurortnoye, Feodosia, Russian Federation,  
e-mail: [ludamir2015@mail.ru](mailto:ludamir2015@mail.ru)*

The article presents results of long-term research (1979–2018) of rare plants in floras of natural complexes of South-Eastern Crimea. An annotated list of 154 vascular plants included in Red Books of Russian Federation, Crimean Republic as well as a list with 105 taxons though conservationally status-free but rare for the region. The analysis of flora of the rare plants in South-Eastern Crimea is conducted. The evaluation of state, distribution, environmental preferability and the number of protected rare plants is shown, evaluation of the flora of rare plants is also elucidated using indexes of species-diversity, species rarity and endemism. The level of rare plants scrutiny in corresponding natural complexes is evaluated. Some ways of conservation of rare plants in South-Eastern Crimea and phytodiversity in general is considered.

**Keywords:** South-Eastern Crimea, natural complexes, Red Books of Russian Federation and Crimean Republic, flora, plant communities, vascular plants, rare species, level of scrutiny, population, biotope, rare plants.

*Потупила в редакцию 15.11.2018 г.*